Moliéri® 20

Drospirenona + Etinilestradiol
3 mg + 0,02 mg
Comprimido Recubierto

PARA PERÚ

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito solamente a usted, no debe darselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta cualquier efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto:
1. ¿Qué es MOLIÉRI® 20 y para qué se utiliza? ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona?
2. ¿Qué necesita saber antes de tomar MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto?
3. ¿Cómo tomar MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto?
4. Posibles efectos secundarios.
5. Conservación de MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto.
6. Contenido del envase y otra información.

1. ¿Qué es MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto y para qué se utiliza?
- **MOLIÉRI® 20** es una píldora anticonceptiva que se utiliza para evitar el embarazo.
- Cada comprimido de las 21 comprimidos contiene una pequeña cantidad de dos hormonas femeninas diferentes, denominadas Drospirenona y etinilestradiol.
- Los anticonceptivos que contienen dos hormonas femeninas denominados anticonceptivos combinados.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto?

Antes de empezar a tomar MOLIÉRI® 20 debe consultar con su médico como usar este producto. Antes de empezar a tomar MOLIÉRI® 20 debe leer la información sobre coágulos sanguíneos en la sección 2. Es especialmente importante leer los síntomas de un coágulo sanguíneo; consulte la sección 2 «Coágulos sanguíneos».
Antes de empezar a tomar MOLIÉRI® 20, su médico le hará algunas preguntas sobre sus antecedentes médicos y familiares. Su médico decidirá si puede prescribirle MOLIÉRI® 20 y/o si es necesario dependiendo de su situación personal, también le dirá cómo tiene que tomar MOLIÉRI® 20.
En este prospecto se describen varias situaciones en las que usted debe interrumpir el uso de MOLIÉRI® 20, o en las que la fiabilidad de MOLIÉRI® 20 puede disminuir. En dichas situaciones, usted no debería mantener relaciones sexuales o debería tomar precauciones anticonceptivas adicionales no hormonales, por ejemplo, un preservativo o métodos de barrera. No utilizar el método del ritmo ni el de la temperatura. Estos métodos pueden no ser fiables puesto que **MOLIÉRI® 20** altera los cambios normales de temperatura corporal y el moco cervical.
MOLIÉRI® 20 al igual que otros anticonceptivos hormonales, no protege frente a la infección por el VIH (SIDA) o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual.

No tome MOLIÉRI® 20:
No debe utilizar MOLIÉRI® 20 si padece alguno de los siguientes trastornos. Si padece alguno de los siguientes trastornos, debe informar a su médico. Su médico le dirá cuál sería el método anticonceptivo alternativo más adecuado.
- Si tiene o ha tenido alguna vez) un coágulo sanguíneo en un vaso sanguíneo de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP), de los pulmones (embolia pulmonar, EP) o otros órganos.
- Si tiene conocimiento de que sufre un trastorno que afecta a la coagulación, como deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína Z, factor V de Leiden o anticuerpos antifosfolípidos.
- Si tiene obesidad o no está de pie durante mucho tiempo (consulte la sección «Coágulos sanguíneos»).
- Si usted tiene (o ha tenido en el pasado) un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) angina de pecho (enfermedad que causa dolores intensos en el corazón y que puede ser el primer signo de un infarto de miocardio) o un accidente isquémico transitorio (AIT, síntomas transitorios de accidente cerebrovascular).
- Si tiene alguna de las enfermedades siguientes, que pueden aumentar el riesgo de presentar una trombosis en las arterias:
  - diabetes grave con daños en los vasos sanguíneos
  - tensión arterial muy alta
  - niveles de grasa muy altos en la sangre (colesterol o triglicéridos)
  - una enfermedad conocida como hiperhomocisteinemia.
- Si tiene (o ha tenido en el pasado) un tipo de migraña llamado «migraña con aura».
- Si usted tiene (o ha tenido en el pasado) una enfermedad del hígado y su función hepática no se ha normalizado todavía.
- Si usted tiene (o ha tenido en el pasado) tumores hepáticos.
- Si usted tiene (o ha tenido en el pasado) o se sospecha que tiene cáncer de mama o cáncer de los órganos sexuales.
- Si usted tiene hemorragias vaginales de causa desconocida.
- Si es alérgica a etinilestradiol o Drospirenona, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Este puede manifestarse con picor, erupción cutánea o hinchazón.
- No tome MOLIÉRI® 20 si tiene hepatitis C y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir o glecaprevir/ pibrentasvir (ver también la sección Uso de MOLIÉRI® 20 con otros medicamentos).

Información adicional sobre poblaciones especiales
Niños y adolescentes
MOLIÉRI® 20 no está indicado para su uso después de la menopausia.
Mujeres en edad avanzada
MOLIÉRI® 20 no está indicado para su uso después de la menopausia.
Mujeres con insuficiencia hepática
No tome MOLIÉRI® 20 si usted sufre una enfermedad hepática. Ver secciones "No use MOLIÉRI® 20" y "Advertencias y precauciones".
Mujeres con insuficiencia renal
No tome MOLIÉRI® 20 si usted está sufriendo un mal funcionamiento de sus riñones o un fallo renal agudo. Ver secciones "No use MOLIÉRI® 20" y "Advertencias y precauciones".

Advertencias y precauciones:

¿Cuándo debe contactar con su médico?
Señales de alerta de coágulos sanguíneos
- Si nota posibles signos de un coágulo sanguíneo que pueden indicar que tiene un coágulo sanguíneo en la pierna (es decir, trombosis venosa profunda), en un pulmón (es decir, embolia pulmonar), un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular (consulte la sección «Coágulos sanguíneos» más adelante).
Para obtener una descripción de los síntomas de estos efectos adversos graves consulte la sección «Coágulos sanguíneos».

Informe a su médico si padece algunos de estos trastornos.
- En algunas situaciones, usted debería extremar el cuidado mientras use MOLIÉRI® 20 o cuando quiere otro anticonceptivo hormonal, y puede ser necesario que su médico le examine de forma periódica.
También debe informar a su médico si la afección se desarrolla o empeora mientras está usando MOLIÉRI® 20.
- si una pariente cercana tiene o ha tenido alguna vez cáncer de mama;
- Si tiene alguna enfermedad del hígado o de la vesícula biliar;
- Si es diabética;
- Si sufre depresión;
- Si tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria intestinal crónica);
- Si tiene lupus eritematoso sistémico (LES, una enfermedad que afecta a su sistema de defensa natural);
- Si tiene síndrome hemolítico urémico (SHU, un trastorno en la coagulación que causa insuficiencia renal);
- Si tiene anemia drepanocítica (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos);
- Si tiene niveles elevados de grasas en la sangre (hipertrigliceridemia) o antecedentes familiares positivos de este trastorno. La hipertrigliceridemia se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollo de pancreatitis (inflamación del páncreas);
- Si precisa cirugía o no está de pie durante mucho tiempo (consulte la sección 2 «Coágulos sanguíneos»);
- Si sufre de dar a luz tiene un mayor riesgo de presentar coágulos sanguíneos. Debe preguntar a su médico cuánto tiempo después de dar a luz debería empezar a tomar MOLIÉRI® 20;
- Si tiene inflamación en las venas bajo la piel (tromboflebitis superficial);
- Si tiene varices;
- Si tiene epilepsia (consulte la sección «Otros medicamentos y MOLIÉRI® 20 »)
- Si tiene una enfermedad que ha aparecido por primera vez durante el embarazo o la utilización previa de hormonas sexuales (p. ej., pérdida de audición, una enfermedad de la sangre llamada porfiria, erupciones cutáneas con ampollas llamada herpes gestacional, una enfermedad nerviosa en la que aparecen movimientos involuntarios (Corea de Sydenham));
- Si tiene o ha tenido alguna vez cloasma (una decoloración de la piel, especialmente de la cara o el cuello conocida como "manchas del embarazo"). Si es así, evite la luz solar o la luz ultravioleta directa o la luz ultravioleta;
- si tiene angioedema hereditario, los productos que contienen estrógenos pueden inducir o empeorar los síntomas del angioedema. Debe consultar a su médico de inmediato si experimenta síntomas de angioedema como hinchazón de la cara, lengua o garganta y/o dificultad para tragar o urticaria, junto con dificultad para respirar.

COAGULOS DE SANGRE
El uso de un anticonceptivo hormonal combinado como Moliéri 20 (Drospirenona + etinilestradiol), aumenta su riesgo de padecer un coágulo de sangre en comparación con no tomarlo. En raras ocasiones un coágulo de sangre puede bloquear vasos sanguíneos y provocar problemas graves.
Se pueden formar coágulos de sangre:
- En las venas (lo que se llama "trombosis venosa", "tromboembolismo venoso" o TEV).
- En las arterias (lo que se llama "trombosis arterial", "tromboembolismo arterial" o TEA).
La recuperación de los coágulos de sangre no es siempre completa. En raras ocasiones, puede haber efectos graves duraderos o, muy raramente, pueden ser mortales.
El riesgo de padecer un coágulo de sangre en cualquier vaso sanguíneo de sangre periférica debido a Moliéri 20 (Drospirenona + etinilestradiol) es pequeño.
CÓMO REFIERE UN COÁGULO DE SANGRE
Busque asistencia médica urgente si nota algunos de los siguientes signos o síntomas:

¿Experimenta algunos de estos signos?	¿Qué es posible que esté sufriendo?
Hinchazón de una pierna o a lo largo de una vena de la pierna o pie, especialmente cuando se acompaña de: • dolor o debilitamiento en la pierna, que se puede sentir únicamente cuando se encuentra de pie o caminando • sensación de calor en la pierna afectada • cambio de color en la pierna, p. ej., se vuelve pálida, roja o azul	Trombosis venosa profunda
• aparición súbita de dificultad para respirar o respiración rápida sin causa desconocida. Otros síntomas son una tos clara, que puede ser sanguinolenta; • dolores agudos que puede aumentar con la respiración profunda; • sensación de mareo o aturdimiento grave; • latidos cardíacos rápidos o irregulares • dolor de estómago intenso; Si no está seguro consulte a su médico, ya que algunos de estos síntomas, como la tos o la dificultad para respirar, pueden ser confundidos con un trastorno más leve, como una infección de las vías respiratorias (p. ej., un «resfriado común»).	Embolia pulmonar
Síntomas que se presentan de forma más frecuente en un ojo: • pérdida inmediata de visión o • visión borrosa indolora que puede progresar a pérdida de visión	Trombosis de la vena retiniana (coágulo sanguíneo en el ojo)
• dolor torácico, malestar, presión, opresión • sensación de opresión o llenado en el pecho, el brazo o bajo el esternón; • sensación de sacidad, indigestión o asfixia; • malestar en la parte superior del cuerpo irradiado a la espalda, la mandíbula, la garganta, un brazo o el estómago; • sudoración, náuseas, vómitos o mareo; • debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento; • latidos cardíacos rápidos o irregulares	Infarto de miocardio
• sensación súbita de debilidad o entumecimiento del rostro, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo; • aparición súbita de confusión, dificultad en el habla o la comprensión; • problemas súbitos de visión en uno o los dos ojos; • problemas súbitos para andar, mareo, pérdida del equilibrio o la coordinación; • cefalea súbita, intensa o prolongada sin causa conocida; • pérdida de conocimiento o desmayo con o sin convulsiones. Ocasionalmente, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser breves y con una recuperación total y casi inmediata pero debe buscar atención médica urgente porque existe el riesgo de sufrir otro accidente.	Accidente cerebrovascular
• hinchazón y leve cambio a color azul de una extremidad; • dolor de extremidad intenso (dolorosa)	Coágulos sanguíneos que bloquean otros vasos sanguíneos

COÁGULOS SANGUÍNEOS EN UNA VENA
¿Qué puede suceder si se forma un coágulo sanguíneo en una vena?
- Se ha relacionado la toma de anticonceptivos hormonales combinados con un aumento del riesgo de coágulos sanguíneos venosos (trombosis venosa). No obstante, estos efectos adversos son infrecuentes. De modo más frecuente, se presentan en los primeros meses de uso de un anticonceptivo hormonal combinado.
- Se ha formado un coágulo sanguíneo en una vena de la pierna o pie, puede causar una trombosis venosa profunda (TVP).
- Un coágulo sanguíneo se desplaza desde la pierna y se aloja en un pulmón puede provocar una embolia pulmonar.
- Muy raramente, se puede formar un coágulo sanguíneo en una vena de otros órganos, como el ojo (trombosis de la vena retiniana).

¿Cuándo es mayor el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo en una vena?
El riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo en una vena es mayor durante el primer año tras de la primera toma de un anticonceptivo hormonal combinado. El riesgo también puede ser mayor después de reiniciar la toma de un anticonceptivo hormonal combinado (el mismo o otro producto) tras una pausa de 4 semanas o más.
Después del primer año, el riesgo disminuye, pero siempre es algo mayor que si no utilizar anticonceptivos hormonales combinados.
Al dejar de usar MOLIÉRI® 20 el riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo desciende hasta niveles normales al cabo de algunas semanas.

¿Qué es el riesgo de formar un coágulo sanguíneo?
El riesgo depende del riesgo innato de coágulo sanguíneo venoso que tenga usted. Su riesgo global de sufrir un coágulo sanguíneo en la pierna o en el pulmón (TVP o EP) con MOLIÉRI® 20 es bajo.
- De 10.000 mujeres que no toman anticonceptivos hormonales combinados y no están embarazadas, unas 2 pueden tener un coágulo sanguíneo en una vena en un año.
- De 10.000 mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados que contienen levonorgestrel, noretisterona o norgestimato, unas 5 pueden tener un coágulo sanguíneo en un año.
- De 10.000 mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados que contienen Drospirenona como MOLIÉRI® 20 entre 5 y 12 pueden tener un coágulo sanguíneo en un año.
- El riesgo de coágulo sanguíneo varía según sus antecedentes médicos personales (consulte «Factores que aumentan el riesgo de coágulo sanguíneo» a continuación).

	Riesgo de desarrollo de coágulo sanguíneo en un año
Mujeres que **no usan** un anticonceptivo hormonal combinado/píldora(s) y no están embarazadas	Cerca de 2 mujeres de cada 10.000
Mujeres que usan un comprimido anticonceptivo hormonal combinado que contiene **levonorgestrel, noretisterona o norgestimato**	Entre 5 y 7 mujeres de cada 10.000
Mujeres que usan Drospirenona + Etinilestradiol	Entre 9 y 12 mujeres de cada 10.000

Factores que aumentan el riesgo de coágulo sanguíneo en una vena
El riesgo de coágulo sanguíneo con MOLIÉRI® 20 es bajo, pero algunos trastornos aumentan el riesgo. El riesgo aumenta:
- si tiene sobrepeso (índice de masa corporal o IMC por encima de 30 kg/m²);
- si algunos de sus familiares cercanos han tenido coágulos sanguíneos en la pierna, los pulmones o en cualquier otro órgano a una edad temprana (p. ej., antes de los 50 años). Si es así, usted podría sufrir un trastorno hereditario en la coagulación;
- si precisa cirugía o no puede estar de pie durante mucho tiempo debido a una lesión o enfermedad, o tiene la pierna escayolada. Se puede tener que suspender el uso de MOLIÉRI® 20 unas varias semanas antes de la cirugía o mientras tenga movilidad reducida. Si necesita interrumpir la toma de MOLIÉRI® 20 pida a su médico que le indique cuándo puede reiniciar la toma.
- al envejecer (especialmente a partir de los 35 años, aproximadamente);
- si ha dado a luz hace pocas semanas;
El riesgo de desarrollo de coágulo sanguíneo aumenta con la cantidad de trastornos que sufra. Informe a su médico si tiene alguna enfermedad adicional. El riesgo de coágulo sanguíneo, especialmente si va sufre alguno de los factores mencionados en el párrafo anterior.
Es importante que informe a su médico si cumple alguno de estos supuestos, aunque no esté seguro. Su médico puede decidir interrumpir el uso de MOLIÉRI® 20
Si alguna de estas suposiciones se aplica mientras toma MOLIÉRI® 20, p. ej., que un familiar cercano sufra una trombosis por causas desconocidas, o si aumenta de peso, informe a su médico.

COÁGULOS SANGUÍNEOS EN UNA ARTERIA
¿Qué puede suceder si se forma un coágulo sanguíneo en una arteria?
Al igual que un coágulo sanguíneo en una vena, un coágulo en una arteria puede causar problemas graves. Por ejemplo, puede causar un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.

Factores que aumentan el riesgo de coágulo sanguíneo en una arteria
Es importante tener en cuenta que el riesgo de un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular debido a la toma de MOLIÉRI® 20 es muy bajo pero puede aumentar:
- con la edad (a partir de aproximadamente los 35 años);
- **si es fumadora.** Cuando tome un anticonceptivo hormonal combinado como MOLIÉRI® 20 se le aconseja dejar de fumar. Si no puede dejar de fumar y tiene más de 35 años, su médico puede aconsejarle la utilización de un tipo distinto de anticoncepción;
- si tiene sobrepeso;
- si tiene la tensión arterial alta;
- si algunos de sus familiares cercanos ha sufrido un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular a una edad temprana (antes de los 50 años). En este caso, usted también puede presentar un mayor riesgo de ataque al corazón o accidente cerebrovascular;
- si usted o algunos de sus familiares cercanos tienen un nivel elevado de grasa en la sangre (colesterol o triglicéridos);
- si sufre migrañas, especialmente migrañas con aura;
- si tiene problemas de corazón (trastornos de las válvulas, alteración del ritmo cardíaco con afectación de los vasos sanguíneos);
- si tiene diabetes.
Si tiene más de una de estas afecciones o si alguna de ellas es particularmente grave, el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo puede ser mayor.
Si alguna de estos supuestos se ahera mientras toma MOLIÉRI® 20, p. ej., si empieza a fumar, un familiar cercano sufre una trombosis por causas desconocidas o si aumenta mucho de peso, informe a su médico.

MOLIÉRI® 20 y cáncer
Se han observado casos de cáncer de mama con una frecuencia ligeramente mayor en las mujeres que toman píldoras combinadas, pero no se conoce si se trata de un hecho casual. Por ejemplo, puede ser que se detecten más tumores en mujeres que usan anticonceptivos combinados porque son examinadas con mayor frecuencia por los médicos. El riesgo de mama disminuye gradualmente después de dejar de tomar anticonceptivos hormonales combinados. Es importante que se explore con regularidad los senos de mama y que se pregunte a contacto con su médico si nota cualquier bulto.
Ocasionalmente, se han comunicado tumores benignos en el hígado, y más raramente tumores malignos en mujeres de anticonceptivos. Acuda a su médico si usted sufre un dolor abdominal inusualmente fuerte.

Trastornos psiquiátricos
Algunas mujeres que usan anticonceptivos hormonales como MOLIÉRI® 20 han notificado depresión o un estado de ánimo depresivo. La depresión puede ser grave y a menudo llevar a pensamientos suicidas. Si experimenta alteraciones del estado de ánimo y síntomas depresivos, consultarse con un doctor para obtener asesoramiento médico adicional lo antes posible.

Sangrado entre periodos
Durante los primeros meses en los que usted está tomando MOLIÉRI® 20, puede tener sangrados inesperados (sangrados fuera del ciclo de la semana de descanso). Si estos sangrados persisten después mas allá de los primeros meses, o si aparecen después de haber tomado MOLIÉRI® 20 durante unos meses, su médico examinará qué funciona mal.
Qué debe hacer si no tiene la regla durante los días de descanso
Si ha tomado correctamente todos los comprimidos, no ha tenido vómitos o diarrea intensa y tampoco ha tomado otros medicamentos, es muy poco probable que esté usted embarazada.
Si la regla prevista no le viene en los ocasiones consecutivos, puede estar embarazada. Consulte con su médico inmediatamente. No empiece a tomar el siguiente blíster hasta que no esté segura de que no está embarazada.

Uso de Moliéri 20 (Drospirenona + etinilestradiol) con otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar cualquier otro medicamento. También debe informar a su médico o dentista que le tome otro medicamento del uso de Moliéri 20 (Drospirenona + etinilestradiol). De esta forma, podrán indicarle si necesita tomar precauciones anticonceptivas adicionales (por ejemplo, preservativos) y, si es así, durante cuánto tiempo o si debe cambiar el uso de otro medicamento que tome.

Algunos medicamentos:
- pueden tener influencia en los niveles sanguíneos de MOLIÉRI® 20
- pueden provocar que este sea **menos efectivo en la prevención del embarazo.**
- pueden causar sangrados inesperados.
Entre ellos se incluyen:
- medicamentos utilizados en el tratamiento de:
  - la epilepsia (p. ej. primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina);
  - tuberculosis (p. ej. rifampicina);
  - infecciones víricas por VIH y virus de la hepatitis C (llamados inhibidores de la proteasa e inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa como ritonavir, nevirapina, efavirenz);
  - infecciones fúngicas (griseofulvina, ketoconazol);
  - artritis, artrosis (etoricoxib);
  - la presión alta en los vasos sanguíneos de los pulmones (bosentán);
  - y los preparados a base de hierba de San Juan
- MOLIÉRI® 20 puede influir sobre el efecto de otros medicamentos, por ejemplo:
  - medicamentos que contienen ciclosporina
  - el antiepiléptico lamotrigina (puede llevar a un aumento de la frecuencia de convulsiones);
  - teofilina (utilizado para tratar problemas respiratorios);
  - tizanidina (utilizado para tratar el dolor muscular y/o espasmos musculares).
No tome Moliéri 20 (Drospirenona + etinilestradiol) si usted tiene hepatitis C y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir; se puede producir aumentos en los resultados de pruebas hepáticas (aumento de la enzima hepática ALT).
No médico le prescribirá otro tipo de anticoncepción antes de comenzar el tratamiento con estos medicamentos. MOLIÉRI® 20 se puede volver a tomar aproximadamente 2 semanas después de la finalización de este tratamiento. Consulte la sección "No use MOLIÉRI® 20".
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Toma de MOLIÉRI® 20 con los alimentos y bebidas
MOLIÉRI® 20 se puede tomar con o sin alimentos, y con algo de agua si fuera necesario.

Pruebas analíticas
Si usted necesita un análisis de sangre, consente con su médico o con el personal del laboratorio que está usted tomando un anticoncepción hormonal combinado, ya que algunos análisis pueden influir en los resultados de algunas pruebas.

Embarazo
Si usted está embarazada, no debe tomar MOLIÉRI® 20. Si se queda embarazada mientras toma MOLIÉRI® 20 debe interrumpir el tratamiento inmediatamente y ponerse en contacto con su médico. Si desea quedarse embarazada, puede dejar de tomar MOLIÉRI® 20 en cualquier momento (consulte también «Si interrumpe el tratamiento con MOLIÉRI® 20»).
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Lactancia
En general, no se recomienda tomar MOLIÉRI® 20 durante el periodo de lactancia. Si usted quiere tomar anticonceptivos mientras está en el periodo de lactancia, debe consultar con su médico.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas
No hay información que sugiera que el uso de MOLIÉRI® 20 tenga algún efecto sobre la capacidad para conducir o para utilizar máquinas.

MOLIÉRI® 20 contiene lactosa
Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

¿Cómo tomar MOLIÉRI® 20 3mg/0,02mg Comprimido Recubierto?
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.
Cada blíster contiene 24 comprimidos.
Tome un comprimido de MOLIÉRI® 20 todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos, pero debe tomarlos cada día a la misma hora aproximadamente.

Toma de comprimidos
Tome obligatoriamente 1 a día 24)
El blíster de MOLIÉRI® 20 contiene 24 comprimidos recubiertos, dispuestos de forma ordenada, dos de ellos (1 y 24 día de una semana. Continúe con el comprimido que sigue inmediatamente al último comprimido del blíster, sin dejar de tomar ningún comprimido. Si usted no debe tomar de forma inmediata el siguiente blíster, debe dejar de tomar los comprimidos durante un intervalo de 4 días, tiempo en el que no debe utilizar ningún método anticonceptivo adicional.
El intervalo sin comprimidos nunca debe superar los 4 días de duración y solo debe iniciarse si se han estado tomando los comprimidos de forma ininterrumpida durante 21 días.
Durante el intervalo de 4 días sin comprimidos suele producirse sangrado y es posible que no haya terminado aun el tratamiento. Siguen tomando los comprimidos.
Después de cada intervalo de 4 días sin comprimidos se inicia un nuevo ciclo de toma de comprimidos **tomando 1 día** 24. Tras la finalización de 24 días de toma ininterrumpida de comprimidos, puede decidir iniciar o no un intervalo de 4 días sin comprimidos.
Si comenzó a tomar MOLIÉRI® 20 por primera vez, o después, para cada fase obligatoria 1 después de un intervalo de 4 días sin comprimidos, para facilitar una correcta administración del producto, se recomienda:
Regla anterior a la toma
Si usted tomó un intervalo de 4 días sin comprimidos o se han estado tomando los comprimidos de forma ininterrumpida durante un intervalo de 21 días, es decir, tras completar la fase obligatoria.
Después de un intervalo de 4 días sin comprimidos se iniciará una nueva fase obligatoria, por lo que deberán tomarse comprimidos de forma ininterrumpida durante un mínimo de 24 días antes de que se produzca un intervalo de comprimidos.
Para llevar un control de la toma diaria del anticonceptivo, cada envase de MOLIÉRI® 20 incluye 28 etiquetas. Se sugiere anotar la fecha de inicio de uso de la tarjeta (día del mes y de la semana) en el tarjetero, presente en el empaque del producto, para no olvidar llevarla.
Si usted tomó MOLIÉRI® 20 por primera vez, siguen tomando los comprimidos de forma ininterrumpida.
El nuevo envase debería recibirse con suficiente antelación, es decir, antes de terminar de usar el último blíster del envase para garantizar que usted no agota sus existencias de comprimidos.
Si usted toma otro anticonceptivo hormonal combinado:
Si usted toma otro anticonceptivo hormonal en el mes anterior
Cambio de un anticonceptivo hormonal combinado, anillo anticonceptivo combinado vaginal o parche
Debe comenzar a tomar MOLIÉRI® 20 preferentemente el día después de tomar el último comprimido activo (el último comprimido que contiene principios activos) de su anticonceptivo anterior. Como máximo, debe esperar los días sin comprimidos o después del último comprimido inactivo) de su anticonceptivo anterior. Cuando cambie desde un anillo anticonceptivo combinado vaginal o parche, siga el consejo de su médico.
Cambio de un anticonceptivo hormonal que contiene únicamente progestágeno (píldora de sólo progestágeno, inyector, implante o sistema intrauterino de liberación (SIL) de progestágeno
Puede cambiar de una píldora de sólo progestágeno cualquier día (en el caso de un implante o un SIL, el mismo día su retirada; si se trata de un inyectable, cuando corresponda la siguiente inyección). Durante los primeros 7 días, siga el consejo de su médico, por ejemplo, preservativo (ver también la sección Uso de MOLIÉRI® 20 con otros medicamentos).
Cambio de un anticonceptivo inyectable
Puede comenzar a tomar MOLIÉRI® 20 entre 21 y 28 días del periodo de inyección. Si comienza más de 28 días después, debe utilizar uno de los métodos denominados de barrera (p. ej., preservativo) durante los 7 primeros días del uso de MOLIÉRI® 20.
Si, después de tomar un inyectable, ha tenido relaciones sexuales, antes de comenzar a tomar MOLIÉRI® 20, debe esperar según de su estar embarazada o esperar a su siguiente menstruación.
Cambio de un anillo de lactancia y quiere empezar a tomar MOLIÉRI® 20 (marvelous) después de tomar un bebe
Lea la sección «Lactancia».
Si usted no está seguro de qué tiene debido sobre cuando empezar.
Si toma más MOLIÉRI® 20 del que debe
No se ha tomado ningún caso de efecto adverso grave por la toma sobredosis de Drospirenona + Etinilestradiol haya causado daños graves.
Si tiene varios comprimidos de una sola vez, puede encontrarse mal o tener vómitos o hemorragia vaginal. Esta hemorragia puede aparecer incluso en chicas que aún no han tenido el primer periodo menstrual, si accidentalmente toman este medicamento. Si usted ha tomado demasiados comprimidos de MOLIÉRI® 20, o descubre que un niño los ha tomado, consulte con su médico o farmacéutico. Si es necesario, pídale que llame a un centro de toxicología.
Si olvidó tomar MOLIÉRI® 20
- Si pasan **menos de 24 horas** desde que tomó un comprimido, la protección frente al embarazo está plena. Tome el comprimido en cuanto lo recuerde, y después, tome los comprimidos siguientes a la hora habitual.
- Si pasan **más de 24 horas** desde que tomó un comprimido, la protección frente al embarazo puede reducirse. Cuanto más comprimidos haya olvidado, mayor es el riesgo de quedarse embarazada.
El riesgo de protección incompleta frente al embarazo es máximo si usted olvida tomar un comprimido al principio o al final del blíster. A continuación se enumeran las recomendaciones que debe seguir en esta situación (tener también en cuenta la combinación):
• Olvido de más de un comprimido del blíster
Consulte con su médico.
• Olvido de un comprimido durante los días 1-7
Tome el último comprimido olvidado. Tome los demás comprimidos como se acostumbra, aunque sea tome el último comprimido del blíster. Utilice otro método anticonceptivo como preservativo **durante los siguientes 7 días consecutivos.** Si ha tenido relaciones sexuales la semana anterior al olvido del comprimido debe saber que hay riesgo de embarazo. En ese caso, consulte con su médico.
• Olvido de un comprimido durante los días 8-14
Tome el comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, aunque esto signifique tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Siga tomando los comprimidos siguientes a la hora habitual. La protección frente al embarazo no disminuye y usted no necesita tomar precauciones adicionales.
• Olvido de un comprimido durante los días 15-24
Puede elegir entre dos posibilidades:
1. Tome el comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, aunque esto signifique tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Siga tomando los comprimidos siguientes a su hora habitual. Si usted toma otros dos comprimidos, la protección frente al embarazo no disminuye y usted no necesita tomar precauciones adicionales.
2. Puede elegir entre dos posibilidades:
Tome el comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, aunque esto signifique tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Siga tomando los comprimidos siguientes a su hora habitual. La protección frente al embarazo no disminuye y usted no necesita tomar precauciones adicionales.
Probablemente, tenda la regla al final del segundo blíster (durante el intervalo de 4 días sin comprimidos) **antes de iniciar este segundo blíster, si usted olvida los comprimidos que debe tomar al comprimido.** Si quiere empezar un nuevo blíster en el mismo día en que le haya normalmente, retrasa el intervalo sin comprimidos **tomando** 4 días.
Si usted sigue una de estas dos recomendaciones, permanecerá protegida frente al embarazo.



Qué debe hacer en caso de vómitos o diarrea intensa
Si tiene vómitos en las 3-4 horas siguientes a la toma de un comprimido o si padece diarrea intensa, hay riesgo de que los principios activos no sean absorbidos totalmente por el organismo. En estos casos, debe seguir los consejos indicados en el apartado «Olvido de un comprimido». Si no es posible o han transcurrido más de 24 horas, sigan los consejos de la sección «Si olvida tomar MOLIÉRI® 20».
Si interrumpe el tratamiento con MOLIÉRI® 20
Puede dejar de tomar MOLIÉRI® 20 cuando lo desee. Si no quiere quedarse embarazada, consulte con su médico acerca de otros métodos eficaces de control de la natalidad. Si quiere quedarse embarazada, lo ideal es dejar de tomar MOLIÉRI® 20 y esperar hasta su menstruación antes de intentar quedarse embarazada. Así podrá calcular la fecha estimada de parto más fiablemente.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios
Al igual que otros medicamentos, MOLIÉRI® 20 puede producir efectos adversos, aunque no todos los padezcan.
Si sufre algún efecto adverso, especialmente si es grave y persistente, o siente algún cambio en su salud que considere que puede estar relacionado con MOLIÉRI® 20, consulte con su médico. Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados presentan un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos (trombosis venosa, TEV) o coágulos sanguíneos en las arterias (tromboembolia arterial, TEA). Para obtener información más detallada sobre los distintos riesgos de tomar anticonceptivos hormonales combinados, vea la sección 2 «Qué necesita saber antes de empezar a tomar MOLIÉRI® 20».
Los efectos adversos más frecuentes notificados con respecto a los siguientes síntomas de angioedema: hinchazón de la cara, lengua y/o garganta y/o dificultad para tragar o urticaria con posible dificultad para respirar. Consulte con su médico inmediatamente si presenta estos síntomas.
Si se presenta, tiendo en las 24 horas siguientes a la toma de un comprimido, los consejos de la sección «Si olvida tomar MOLIÉRI® 20».
Si interrumpe el tratamiento con MOLIÉRI® 20
Puede dejar de tomar MOLIÉRI® 20 cuando lo desee. Si no quiere quedarse embarazada, consulte con su médico acerca de otros métodos eficaces de control de la natalidad. Si quiere quedarse embarazada, lo ideal es dejar de tomar MOLIÉRI® 20 y esperar hasta su menstruación antes de intentar quedarse embarazada. Así podrá calcular la fecha estimada de parto más fiablemente.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios
Al igual que otros medicamentos, MOLIÉRI® 20 puede producir efectos adversos, aunque no todos los padezcan.
Si sufre algún efecto adverso, especialmente si es grave y persistente, o siente algún cambio en su salud que considere que puede estar relacionado con MOLIÉRI® 20, consulte con su médico. Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados presentan un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos (trombosis venosa, TEV) o coágulos sanguíneos en las arterias (tromboembolia arterial, TEA). Para obtener información más detallada sobre los distintos riesgos de tomar anticonceptivos hormonales