

**simeticona**

Bula para paciente

Cápsula dura

125 mg

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**simeticona**

### APRESENTAÇÃO

Cápsula dura 125 mg: embalagem com 2, 4 e 10 cápsulas duras.

### USO ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

simeticona.....125 mg

Excipientes\* q.s.p.....1 cápsula

\*excipientes: gelatina, polissorbato 80, dióxido de titânio, amarelo de crepúsculo, azul brilhante, vermelho de azorrubina, água purificada.

---

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

---

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen.

Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A simeticona reduz a tensão superficial dos líquidos digestivos, promovendo o rompimento de bolhas gasosas e dificultando a formação de bolhas no trato gastrointestinal. Essa ação evita a retenção de gases no aparelho digestivo, aliviando sintomas relacionados ao acúmulo de gases, como dor, desconforto, aumento do volume abdominal e flatulência. A simeticona não é absorvida no trato gastrointestinal e não interfere na secreção gástrica ou na absorção de nutrientes.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar simeticona se tiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para casos de distensão abdominal grave, cólica grave, dor persistente (mais que 36 horas), massa palpável na região do abdômen, alergia a simeticona e a seus derivados, perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

Não use simeticona cápsulas se você apresentar suspeita de perfuração ou obstrução intestinal.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A simeticona pode causar efeitos adversos, como diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

Não existem recomendações especiais para pacientes idosos.

A simeticona não é indicada para crianças.

Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

Não utilize dose maior que a recomendada.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

Se você estiver grávida ou amamentando, você deve informar seu médico antes de usar este medicamento.

Não são conhecidas interações de simeticona com outros medicamentos ou alimentos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Atenção: Contém os corantes amarelo de crepúsculo, azul brilhante e vermelho de azorrubina que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características físicas e organolépticas: cápsula gelatinosa dura de cor roxa transparente com selagem transparente a branca. Contém líquido viscoso, branco-acinzentado, translúcido.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não há estudos dos efeitos da simeticona administrada por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia desta apresentação, a administração deve ser somente pela via oral.

**ADULTOS:** Ingerir 1 cápsula a cada 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 4 cápsulas por dia.

**Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você esqueceu de tomar simeticona no horário pré-estabelecido, por favor procure seu médico ou farmacêutico

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Simeticona não é absorvida pelo organismo. Ela atua somente dentro do aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes sem alterações. Portanto, reações indesejáveis são menos prováveis de ocorrer.

- Eczema de contato (inflamação na pele);
- Em casos raros, reações imediatas como urticária (alergia da pele).

**Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Experiência de superdose após a comercialização é limitada, sendo registrada com ou sem sintomas. Sintomas podem incluir diarreia e dor abdominal.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

MEDICAMENTO NOTIFICADO.

Notificado e produzido por:

**EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.**

Rod. Pres. Castello Branco, 3565 – Itapevi – SP

CNPJ do titular do registro: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**



[www.eurofarma.com.br](http://www.eurofarma.com.br)  
0800-704-3876  
[euroatende@eurofarma.com.br](mailto:euroatende@eurofarma.com.br)

