

INSTRUÇÃO DE USO
Paravision Film®

INSTRUÇÃO DE USO

Paravision Film®

Paravision Film®

Lubrificante e protetor para os olhos

Solução oftálmica estéril

USO ADULTO

APRESENTAÇÃO

Paravision Film® é acondicionado em frasco conta-gotas de plástico contendo 10 mL e 15 mL de solução oftálmica estéril, para administração oftálmica.

Paravision Film® contém componentes que contribuem para sua capacidade de imitar lágrimas naturais proporcionando alívio instantâneo da queimação, irritação e desconforto devido à secura dos olhos ou exposição à telas de computador, celulares e monitores, ao vento ou sol. Promove alívio da secura, desconforto e irritação que podem ser associados ao uso de lentes de contato. O modo de ação do **Paravision Film®** é de natureza física para lubrificar a superfície ocular.

COMPOSIÇÃO

Paravision Film® contém: carmelose sódica, ácido bórico, borato de sódio decahidratado, cloreto de cálcio di-hidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de polidrólio, ácido clorídrico (1 mol/L), hidróxido de sódio (1 mol/L), água para injetáveis.

INDICAÇÕES

Paravision Film® é indicado para lubrificação e/ou alívio de irritações, ardor e secura dos olhos, ou também para a proteção a irritações oculares.

CONTRAINDICAÇÕES

Paravision Film® é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Para evitar contaminação ou possível lesão ocular, não toque a ponta do frasco em nenhuma superfície e evite o contato com o olho. Fechar bem o frasco depois de usar.

Não use se a embalagem do **Paravision Film®** mostrar evidências de adulteração. Não use se a solução mudar de cor ou ficar turva.

Interrompa o uso de **Paravision Film®** e consulte um médico se sentir dor nos olhos, alterações na visão, vermelhidão contínua ou irritação dos olhos, ou se a condição piorar.

Use antes da data de validade marcada no recipiente.

Gravidez: Não há dados de estudos específicos sobre o uso de **Paravision Film®** durante a gravidez e a lactação em humanos; no entanto, estudos não clínicos com Carboximetilcelulose (CMC) não demonstraram quaisquer efeitos prejudiciais na gravidez.

Lactação: **Paravision Film®** também não foi estudado em mulheres que amamentam; no entanto, não se espera que o CMC seja absorvido sistemicamente; portanto, não se espera que seja excretado no leite materno.

Uso pediátrico: segurança e eficácia não foram demonstrados com **Paravision Film®** em pacientes pediátricos.

Uso geriátrico: Nenhuma diferença geral de segurança ou eficácia foi observada entre pacientes idosos e outros adultos.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e usar máquinas: **Paravision Film®** pode causar visão turva transitória, o que pode prejudicar a capacidade de dirigir ou operar máquinas. O paciente deve esperar até que a visão fique clara antes de dirigir ou usar máquinas.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas conhecidas.

Os medicamentos oculares concomitantes devem ser administrados com pelo menos 5 minutos de intervalo da instilação de **Paravision Film®**.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram identificadas durante o uso de lubrificantes para os olhos a base de carmelose: secreção ocular, irritação ocular, queimação e desconforto ocular, dor ocular, prurido ocular, hiperemia palpebral / conjuntival, distúrbio visual, sensação de corpo estranho nos olhos, hiperemia ocular, hipersensibilidade incluindo alergia ocular com sintomas de inchaço ocular, edema palpebral ou eritema palpebral.

MODO DE USO

O modo de uso indicado para o **Paravision Film®** é instilar 1 a 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) conforme necessidade ou conforme indicado por um profissional da saúde. Se **Paravision Film®** for usado para lubrificar e umidificar lentes de contato, aplique 1 a 2 gotas em cada olho, conforme necessário, com as lentes de contato no olho.

ATENÇÃO: O produto é de uso múltiplo, deve ser utilizado por um único usuário. Não deve ser compartilhado por outras pessoas.

Os medicamentos oculares concomitantes devem ser administrados com pelo menos 5 minutos de intervalo da instilação de **Paravision Film®**.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Paravision Film® não requer condições especiais de armazenamento. **Paravision Film®** deve ser armazenado antes ou depois da abertura, à temperatura ambiente (conservar entre 15°C e 30°C).

O prazo de validade de 24 meses está impresso na embalagem externa. Não deve ser usado após a data de validade. Depois de aberto, é válido por 180 dias.

DIZERES LEGAIS

Registro Anvisa nº: 80164790023

Farm. Resp. Subst.: Dra. Ivanete Aparecida Dias Assi – CRF-SP 41.116

Fabricado e Registrado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Rod. Pres. Castello Branco, 3565 – Itapevi – SP

CNPJ do titular do registro: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

