

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DERMALIV

CREMA TÓPICA

FÓRMULA

Cada 100 g de crema contiene:

Benzocaína	1,000 g
Triclosan	0,200 g
Mentol	0,375 g
Excipientes	c.s.

ACCIONES

Benzocaína es un anestésico local que actúa bloqueando la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio.

Triclosan es un potente agente antiséptico que es activo frente a bacterias gram (+) y gram (-), hongos *Candida albicans*.

Mentol es un alcohol terpénico secundario que aplicado localmente tiene efecto refrescante y produce sensación de frescura, probablemente como resultado de un efecto sobre los nervios sensoriales. También se ha descrito que posee de antisépticas y anestésicas suaves. Produce sensación de frío por estimulación específica de dichos receptores, correspondientes a terminaciones nerviosas libres de los nervios cutáneos o de las mucosas, los mismos que conducen la sensación de dolor.

El Alcanfor aplicado localmente sobre la piel tiene efecto débilmente antiséptico, algo anestésico y rubefaciente.

DESTINO EN EL ORGANISMO

Los ingredientes activos de esta pomada se fijan sobre la superficie de la piel, desde donde son absorbidos hacia las capas más internas de ésta, y posteriormente pasan al torrente sanguíneo en muy pequeñas cantidades.

INDICACIONES

Está indicado para aliviar el dolor y molestias de quemaduras leves (causadas por el sol u otros agentes) o heridas menores de la piel. También se utiliza para el alivio de picaduras de insectos y en caso de prurito.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No use en zonas cercanas a los ojos, membranas mucosas, labios, boca, genitales, piel irritada y heridas profundas o punzantes.

No usar si sufre de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

Sólo es de uso externo.

No use en caso de quemaduras graves ni por períodos prolongados (más de 7 días). Si la afección persiste, o si se desarrolla infección, erupción cutánea o irritación, suspenda su uso y consulte con un médico.

Si Ud. experimenta rash cutáneo, sensación de quemadura, dolor, hinchazón, etc. después de aplicar este producto discontinúe su uso y consulte a su médico o farmacéutico.

No use en niños menores de 2 años. En niños de entre 2 y 3 años úselo con precaución.

INTERACCIONES

No se ha informado de interacciones con otros medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos se ha presentado irritación de la piel, ardor y/o picazón.

No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO DE LA DOSIS EXCESIVA

Debido a su aplicación local sobre la piel y a su baja absorción sistémica es muy poco probable la formación de un cuadro de intoxicación.

Se ha informado de efectos asociados al uso discriminado del producto y que son: confusión, visión borrosa, escalofríos, cansancio inusual, dolor intenso, hinchazón en la zona de aplicación, de los ojos y la boca. En este caso Ud. debe consultar al médico en forma inmediata.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía de administración: Uso tópico.

Dosificación: Aplique tópicamente 3 a 4 veces al día dando un suave masaje en la zona afectada hasta que la crema desaparezca.