

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**DESDOL****COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****(Paracetamol - Clorzoxazona)****COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol	300 mg
Clorzoxazona	250 mg

Excipientes c.s. Almidón de maíz, Almidón glicolato de sodio, Polividona K-30, Macrogol 6000, Talco, Acido estárico, Sorbitol polvo, Dióxido de silicio coloidal, Etilcelulosa 10 cps, Hipromelosa E-15, *Recubrimiento polimérico blanco (Opaspray blanco K-1-7000-S), Talco, Colorante FD&C azul N°1, laca aluminica, Dietilftalato.

* Composición del recubrimiento polimérico blanco (Opaspray blanco K-1- 7000-S)

Metanol
Dióxido de titanio
Hipromelosa

INDICACIÓN:

Analgésico, relajante muscular.

ADVERTENCIAS:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. No sobrepasar las dosis indicadas. El consumo de alcohol y otras drogas depresoras del sistema nervioso central puede dar efectos aditivos. Se han reportado casos de reacciones severas de hepatotoxicidad en pacientes que reciben clorzoxazona. Deberá consultar con un médico y discontinuar el medicamento ante cualquier signo de hepatotoxicidad como: fiebre, rash, anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, dolor en el cuadrante superior, orina oscura o ictericia.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes. No utilizar durante el embarazo, ya que se desconocen los efectos sobre el feto. No utilizar durante la lactancia.
Pacientes con alteración de la función hepática o renal.

INTERACCIONES:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted haya adquirido sin receta.

Se han descrito interacciones con los siguientes productos: No debe administrarse en asociación con alcohol, anestésicos generales, depresores del S.N.C., o inhibidores de la MAO.

No usar junto con anticoagulantes orales ya que se potencia el efecto de estos últimos.

REACCIONES ADVERSAS

Las más frecuentes son: somnolencia, mareos, dolor de cabeza. Las menos frecuentes son: alteraciones gastrointestinales, como pirosis, diarrea, constipación. Algunos pacientes han manifestado coloración de la orina (rojo púrpura), este hecho no tiene mayor importancia y cesará al discontinuar el medicamento.

PRECAUCIONES:

Este producto contiene almidón y sorbitol, precaución en pacientes celíacos y diabéticos respectivamente. Debería usarse con observación en pacientes alérgicos a otros AINEs. Si llegara a presentarse este tipo de reacción que se caracteriza por urticaria, inflamación y edema de la piel, el medicamento debe suspenderse. Precaución en pacientes que conducen vehículos o manipulan maquinaria pesada.

DOSIS:

El médico deberá indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular no obstante la dosis usual recomendada es: 1 a 2 comprimidos 3 a 4 veces al día. En la tercera edad, administrar la mitad de la dosis. En niños **menores de 12 años** no se recomienda.

MODO DE EMPLEO:

Ingerir por vía oral con suficiente líquido.

SOBREDOSIS:

Provoca trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), acompañado de mareos, somnolencia, dolor de cabeza, debilitamiento del tono muscular. El tratamiento se resume en lavaje gástrico o emesis, seguido de la administración de carbón activado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**