

5. FARMACOCINÉTICA

Algunos investigadores han encontrado que la Diosmina es absorbida en el tracto intestinal, donde además sufre una degradación inicial.

En estudios en seres humanos se ha encontrado que luego de una administración oral del producto, su excreción es esencialmente por vía renal; la excreción urinaria es de alrededor de 14% de la dosis administrada. La vida media de eliminación es de aproximadamente 11 horas. La Diosmina es fuertemente metabolizada, especialmente debido a la presencia de varios ácidos fenólicos urinarios.

6. INDICACIONES Y USOS

Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, orgánica y funcional que se manifiesta por: pesadez, dolor y calambres nocturnos en las extremidades inferiores.

Tratamiento de hemorroides y de los signos funcionales ligados a las crisis hemorroidales: dolor, tenesmo, prurito, edema, rubor, sangramiento; con las siguientes restricciones: indicación quirúrgica perentoria de enfermedad hemorroidal, asociación simultánea con otra patología anal, hemorroides procidentales permanentes u otra patología causal.

7. CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a Diosmina y/o Hesperidina y a alguno de los componentes de la formulación.

8. REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado ligeros malestares gastrointestinales y desórdenes neurovegetativos.

La frecuencia de las reacciones adversas es descrita como sigue:

9. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No se han reportado interacciones con otros medicamentos.

10. SOBREDOSIS

No se han reportado casos de sobredosis.

11. POSOLOGÍA

Síntomas de insuficiencia venolinfática crónica y funcional: 2 comprimidos al día.

En la enfermedad hemorroidal, tratamiento de los signos funcionales de las hemorroide, 2 comprimidos al día.

En la crisis hemorroidal aguda, 6 comprimidos por 4 días, 4 comprimidos por 3 días, y finalmente 2 comprimidos al día como mantención.

12. PRESENTACIÓN

Envase con 30 o 60 comprimidos recubiertos.

13. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 25°C.