



# IMPORTANCIA DE LA MEDICACIÓN EN EL PACIENTE CON **RIESGO** CARDIOVASCULAR

El tratamiento con estatinas mejora la sobrevida y disminuye la incidencia de enfermedad cardiovascular, por lo que se recomienda como estrategia de prevención primaria en los siguientes casos:<sup>1-3</sup>

- ▶ Pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria, ACV isquémico o enfermedad vascular periférica clínica.
- ▶ Pacientes con diabetes, hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica y sin antecedentes vasculares, aunque con un riesgo cardiovascular mayor.

Se recomienda administrar dosis de estatinas

**ATROLIP**  
Atorvastatina

de **40 mg - 80 mg**

**Regutol**  
ROSUVASTATINA

o  
de **20 mg - 40 mg**

de alta intensidad y evaluar la combinación de fármacos hipolipemiantes cuando los objetivos terapéuticos propuestos no se cumplan en los siguientes grupos:<sup>1</sup>



## Grupo de pacientes



## Objetivo terapéutico

▶ **Hipercolesterolemia familiar**

▶ **<100 % o 50 % de reducción**

▶ **Diabético con 1 o más factores de riesgo o daño de órgano blanco**


▶ **<70 % o 50% de reducción\***

▶ **C-LDL > 190 mg/dL**

▶ **<100 % o 50 % de reducción**

C-LDL: Colesterol de baja densidad. \*El objetivo de buscar una reducción de al menos el 50 % es más relevante cuando el paciente tiene un valor basal de C-LDL entre 70 y 135 mg/dL.<sup>1</sup>

## **EXPANSIA** Clopidogrel (Bisulfato) 75 mg EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO



Clopidogrel es el inhibidor seminal de P2Y12 con el mayor registro de seguridad para el paciente a lo largo de los años.<sup>4</sup>

Las guías actuales recomiendan el uso de clopidogrel y aspirina durante 1 año en los pacientes tratados con agentes fibrinolíticos.<sup>4</sup>

Los datos del estudio CLARITY indican que agregar clopidogrel al tratamiento con fibrinolíticos en los pacientes <75 años es efectivo y seguro.<sup>4</sup>

La terapia antiplaquetaria dual con aspirina y clopidogrel reduce los eventos cardiovasculares importantes en los pacientes con trombólisis e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y tratados con fibrinolíticos.<sup>4</sup>

Este material ha sido aprobado por el Departamento Médico de Eurofarma Centro América y República Dominicana.

Material Exclusivo para profesionales de la salud

**ATROLIP**  
Atorvastatina

**ATROLIP PLUS**  
Atorvastatina+Ezetimibe

**EXPANSIA**  
Clopidogrel (Bisulfato) 75 mg

**Regutol**  
ROSUVASTATINA

**eurofarma**  
tu vida mueve la nuestra