

**VADE
ME
CUM** **2023**

VADEMECUM 2023 ÍNDICE

GENERAL

Aerogastrol	08	Duomo	25	Olmesartán	43
Aftagel Gel Tópico	08	Duomo HP	26	Olmesartán + Hidroclorotiazida	44
Alta D	09	Esc	26	Pantocal	44
Amato	09	Euroderm	27	Parodox	45
Aminoxine Plus	10	Femiplus 20 CD	27	Parodox XR	45
Anfebutamona	10	Femiplus CD	28	Pietra ED	46
Antrofi	11	Fesamil	28	Procion	46
Apetrol	11	Findaler	29	Radigen	47
Beta Complex	12	Finder	30	Redux	47
Betavol	12	Gesidol	30	Shotvit	48
Betina	13	Gesidol	31	Shotvit Probiótico 3	48
Bilaten D	14	Gesiproct	32	Shotvit Silver	48
Bisopril	14	Ginna	33	SOP	49
Bropavol Jarabe	15	Holmes H	33	Sucralmax	49
Butrino	15	Kalitium	34	Tadalafilo	50
Butrino XL	16	Lactoflora	34	Támisa 20	50
Clavam Duo	16	Lactoflora	35	Támisa 30	51
Clodavan	16	Letico	35	Tiriz	51
Clotrimin	18	Levoxin	36	Tramavolta	52
Clotrimin B	18	Limiar	36	Tricolon	52
Coques	19	Lucaste	37	Tronsalan	53
Cortigrip Día-Noche	19	Lugano	38	Tuntá	53
Dalun	20	Maite	38	Veralpres	54
Dermaliv	21	Mareamin	39	Vesnidan	54
Desdol	21	Medazol	39	Vitabral	55
Destrel	22	Melatonina	40	Zoperil	55
Desvenlafaxina	22	Mi Vit C	40		
Deucodol Forte	23	Mi Vit D	41		
Deucotos	23	Mio Relax	41		
Diclac Gel	24	Montelukast	42		
Dirtop	24	Movinol	42		
Dolostat BI	25	Olanzapina	43		

VADEMECUM 2023 ÍNDICE

PRINCIPIO ACTIVO

Alcanfor/Benzocaína/Mentol/Triclosan	21	Dimenhidrinato	39	Paroxetina	45
Amoxicilina/Ácido Clavulánico	16	Doxazosina	25	Prednisona	46
Anfebutamona	10	Doxazosina/Finasterida	26	Pregabalina	36
Anfebutamona	15	Drospirenona + Etinilestradiol	27	Probióticos y Prebióticos	34
Anfebutamona Clorhidrato	16	Escitalopram Oxalato	26	Probióticos y Prebióticos	35
Benzocaína - Cetilpiridinio	08	Fentermina	47	Promestrieno	12
Betametasona (Dipropionato)	12	Formoterol Fumarato + Fluticasona Propionato	38	Propafenona	53
Betametasona Fosfato Disódico	12	Gestodeno + Etinilestradiol	50	Risperidona	47
Biotina+Aminoácidos+Zinc	12	Hesperidina + Diosmina	54	Sildenafil	24
Bisoprolol	14	Hidroxizina	20	Sucralfato	49
Bromhexina	15	Ibuprofeno	23	Tadalafilo	50
Candesartán+Hidroclorotiazida	14	Ketoconazol	30	Topiramato	09
Carbonato De Litio	34	Ketoprofeno	25	Tramadol Clorhidrato + Paracetamol	52
Celecoxib	19	Lamotrigina	35	Valsartán	54
Cetirizina	29	Levocetirizina	51	Vitamina C	40
Ciclobenzaprina	41	Levodropropizina	28	Vitamina D	41
Ciproheptadina/Tiamina/Piridoxina	11	Levofloxacin	36	Vitaminas B1, B2, B6	13
Riboflavina/Nicotinamida/Ácido Ascórbico	11	Lidocaína/Tribenósido	32	Zopiclona	55
Ciproterona + Etinilestradiol	49	Melatonina	40		
Clobetasol	17	Mepiramina/Pamabrom/Paracetamol	32		
Clordiazepóxido Clorhidrato/Metoclopramida Clorhidrato Monohidrato/Simeticona	08	Metronidazol	39		
Clorfenamina/Paracetamol/Pseudoefedrina	19	Mometasona	27		
Clorfenamina/Codeína/Pseudoefedrina	23	Montelukast	37		
Clormadinona + Etinilestradiol	38	Multivitamínicos	48		
Clotrimazol	18	Nitrato de Fenticonazol	33		
Clotrimazol/Betametasona	18	Olanzapina	43		
Colágeno	42	Olmesartán	43		
Colecalciferol	09	Olmesartán + Hidroclorotiazida	44		
Colecalciferol	41	Pantoprazol	44		
Desogestrel	22	Paracetamol	30		
Desvenlafaxina	22	Paracetamol	31		
Diclofenaco	44	Paracetamol + Clorzoxazona	21		
Dienogest	46	Pargeverina	52		

ÍNDICE

ÁREA TERAPÉUTICA

ANALGÉSICOS

DESDOL Paracetamol 300 mg Clorzoxazona 250 mg	21
GESIDOL COMP. 1 g Paracetamol 1000 mg	31
GESIDOL INFANTIL JARABE Paracetamol 120 mg/5 mL	30
GESIDOL INFANTIL SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES Paracetamol (acetaminofeno) 10 g/100 mL	31
GESIDOL MUJER Paracetamol 500 mg Pamabrom 25 mg Mepiramina maleato 15 mg	32
TRAMAVOLTA 37.5/325 Tramadol clorhidrato 37,5 mg Paracetamol 325,0 mg	52

ANESTÉSICO TÓPICO

AFTAGEL GEL TÓPICO BUCAL Benzocaína 5,0 g Cetilpiridinio cloruro 0,5 g	08
DERMALIV CREMA TÓPICA Benzocaína 1,000 g Triclosan 0,200 g Mentol 0,375 g Alcanfor 0,097 g	20
GESIPROCT CREMA RECTAL Tribenósido 5,00 g Lidocaína clorhidrato 2,00 g	31

ANOREXÍGENO

REDUX Fentermina Clorhidrato 37,5 mg	46
--	----

ANTIBIÓTICOS

CLAVAM DUO 400/57 Amoxicilina (como Amoxicilina Trihidrato) 400 mg Ácido Clavulánico (como Clavulanato de Potasio) 57 mg	16
CLAVAM DUO 875/125 Amoxicilina (como Amoxicilina Trihidrato) 875 mg Ácido Clavulánico (como Clavulanato de Potasio) 125 mg	16
LEVOXIN 750 mg Levofloxacino (en forma hemihidratada) 750 mg	36

ANTI-FÚNGICO USO TÓPICO

FINDER CHAMPÚ 1% Ketoconazol 1,00 g/100 mL	30
--	----

ANTI-CRIPAL

CORTIGRIP DÍA/NOCHE Cada comprimido recubierto Día (Blanco) contiene: Paracetamol 500,00 mg Pseudoefedrina clorhidrato 30,00 mg Cada comprimido recubierto Noche (Azul) contiene: Paracetamol 500,00 mg Pseudoefedrina clorhidrato 30,00 mg Clorfenamina Maleato 4,00 mg	19
--	----

ANTI-HISTAMÍNICOS

DALUN Hidroxizina 20 mg	20
FINDALER COMPRIMIDOS Cetirizina diclorhidrato 10 mg	29
MAREAMIN Dimenhidrinato 100,00 mg	39
TIRIZ Diclorhidrato de Levocetirizina 5,0 mg	51

ANTI-INFLAMATORIOS (AINEs)

COQUES Celecoxib 200 mg	19
DEUCODOL SUSPENSIÓN ORAL Ibuprofeno 100 mg/5 mL	23
DICLAC GEL Diclofenaco dietilamina 1,16 g	24
DOLOSTAT BI Ketoprofeno 150 mg	25

ANTIMICÓTICOS

CLOTRIMIN CÁPSULA BLANDA Clotrimazol 500 mg	18
CLOTRIMIN-B CREMA TÓPICA Clotrimazol 1,00 g Betametasona (como dipropionato) 0,06 g	18

ANTITUSIVOS

BROPAVOL JARABE Bromhexina clorhidrato 8 mg/5 mL	15
DEUCOTOS JARABE Codeína fosfato 0,200 g Pseudoefedrina clorhidrato 0,150 g Clorfenamina maleato 0,010 g	23
FESANIL JARABE Levodropropizina 30 mg/5 mL	28

ÍNDICE

ÁREA TERAPÉUTICA
ANTIVERTIGINOSO

BETINA Betahistina como diclorhidrato 16 mg	13
BETINA Betahistina como diclorhidrato 24 mg	13

CORTICOIDES

BETAVOL Betametasona (en forma de dipropionato) 5 mg Betametasona (en forma de fosfato disódico) 2 mg	12
CLODAVAN SOLUCIÓN TÓPICA 0,05% Clobetasol propionato 0,05 g	17
CLODAVAN CREMA TÓPICA 0,05% Clobetasol propionato 0,05 g	17
EURODERM CREMA TÓPICA 0,1% Mometasona Furoato 0,100 g/100 g	27
PROCION Prednisona 20 mg	46

CARDIOLOGÍA

ANTIARRÍTMICO	
TUNTÁ Clorhidrato de Propafenona 300 mg	53
ANTIHIPERTENSIVOS	
BILATEN-D 16/12.5 Candesartán cilexetilo 16 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg	14
BISOPRIL 1.25 mg Bisoprolol fumarato 1.25 mg	14
BISOPRIL 2.5 mg Bisoprolol fumarato 2.5 mg	14
BISOPRIL 5 mg Bisoprolol fumarato 5 mg	14
DUOMO Doxazosina 4 mg	25

ANTIHIPERTENSIVOS (cont.)

OLMESARTÁN MEDOXOMILO Olmesartán medoxomilo 20,00 mg	43
OLMESARTÁN MEDOXOMILO Olmesartán medoxomilo 40,00 mg	43
OLMESARTÁN MEDOXOMILO/HIDROCLOROTIAZIDA Olmesartán medoxomilo 40,00 mg Hidroclorotiazida 12,5 mg	44
VERALPRES 80 mg Valsartán 80 mg	54
VERALPRES 160 mg Valsartán 160 mg	54

INSUFICIENCIA CARDÍACA

BISOPRIL 1.25 mg Bisoprolol fumarato 1.25 mg	14
BISOPRIL 2.5 mg Bisoprolol fumarato 2.5 mg	14
BISOPRIL 5 mg Bisoprolol fumarato 5 mg	14
VERALPRES 80 mg Valsartán 80 mg	54
VERALPRES 160 mg Valsartán 160 mg	54

DOLOR

DOLOR MUSCULAR	
MIO RELAX Ciclobenzaprina clorhidrato 10 mg	41
DOLOR NEUROPÁTICO	
LIMIAR 75 mg Pregabalina 75,00 mg	36
LIMIAR 150 mg Pregabalina 150,00 mg	36

CASTROENTEROLOGÍA

AEROGASTROL Metoclopramida 5 mg/Clordiazepóxido 5 mg/Simeticona 100 mg	08
PANTOCAL Pantoprazol 40 mg	44
SUCRALMAX Sucralfato 1 g/5 mL	49
TRICOLON Pargeverina clorhidrato 5 mg/mL	52

QUIMIOTERÁPICO TÓPICO

MEDAZOL GEL TÓPICO 0,75% Metronidazol 0,75 g	39
--	----

RESPIRATORIO

ANTIASMÁTICOS	
LUCASTE COMPRIMIDOS Montelukast (como Sal Sódica) 10,0 mg	38
LUCASTE COMPRIMIDOS MASTICABLES 4 mg Montelukast (como Sal Sódica) 4,0 mg	38
LUCASTE COMPRIMIDOS MASTICABLES 5 mg Montelukast (como Sal Sódica) 5,0 mg	38
LUCASTE GRANULADO ORAL 4 mg Montelukast (como Sal Sódica) 4,0 mg	38
LUGANO 12/250 POLVO PARA INHALACIÓN EN CÁPSULAS Fumarato de Formoterol dihidratado 12 mcg Propionato de Fluticasona 250 mcg	39
MONTELUKAST Montelukast (como Sal Sódica) 10,0 mg	43

VADEMÉCUM 2023 ÍNDICE

ÁREA TERAPÉUTICA

SALUD FEMENINA

ANTICONCEPTIVOS

DESTREL 22
Desogestrel 0,075 mg

FEMIPUS CD 28
Drospirenona 3,00 mg
Etinilestradiol 0,03 mg

FEMIPUS 20 CD 27
Drospirenona 3,00 mg
Etinilestradiol 0,02 mg

MAITE 38
Etinilestradiol 0,03 mg
Acetato de clormadinona 2 mg

SOP 49
Etinilestradiol 0,035 mg
Acetato de Ciproterona 2,000 mg

TAMISA 30/75 51
Etinilestradiol 30 µg
Gestodeno 75 µg

TAMISA 20/75 50
Etinilestradiol 20 µg
Gestodeno 75 µg

ANTIFÚNGICOS

GINNA CREMA VAGINAL 2% 33
Nitrato de fenticonazol 2,00 g

ESTRÓGENOS

ANTROFI CREMA VAGINAL 1% 11
Promestrieno 10,00 mg

TRATAMIENTO ENDOMETRIOSIS

PIETRA ED 46
Dienogest 2 mg

SALUD MASCULINA

DISFUNCIÓN ERECTIL

DIRTOP 50 mg 24
Sildenafil (como citrato) 50 mg

DIRTOP 100 mg 24
Sildenafil (como citrato) 100 mg

TADALAFILO 5 mg 50
Tadalafil 5 mg

TADALAFILO 20 mg 50
Tadalafil 20 mg

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

DUOMO 25
Doxazosina (como mesilato) 4,00 mg

DUOMO HP 2/5 26
Doxazosina (como mesilato) 2 mg
Finasterida 5 mg

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

AMATO 25 mg 09
Topiramato 25 mg

AMATO 50 mg 09
Topiramato 50 mg

AMATO 100 mg 09
Topiramato 100 mg

ANFEBUTAMONA 150 mg 10
Clorhidrato de anfebutamona 150.00 mg

ANFEBUTAMONA 300 mg 10
Clorhidrato de anfebutamona 300.00 mg

BUTRINO 150 mg 15
Anfebutamona Clorhidrato 150.00 mg

BUTRINO XL 150 mg 16
Anfebutamona Clorhidrato 150.00 mg

BUTRINO XL 300 mg 16
Anfebutamona Clorhidrato 300.00 mg

DESVENLAFAXINA 50 mg 22
Desvenlafaxina
(como succinato monohidrato) 50 mg

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

DESVENLAFAXINA 100 mg 22
Desvenlafaxina
(como succinato monohidrato) 100 mg

ESC 10 mg 26
Escitalopram (como Oxalato) 10 mg

ESC 20 mg 26
Escitalopram (como Oxalato) 20 mg

KALITIUM 300 mg 34
Carbonato de Litio 300 mg

KALITIUM 450 mg 34
Carbonato de Litio 450 mg

LETICO 25 mg 35
Lamotrigina 25 mg

LETICO 50 mg 35
Lamotrigina 50 mg

LETICO 100 mg 35
Lamotrigina 100 mg

OLANZAPINA 5 mg 43
Olanzapina 5 mg

OLANZAPINA 10 mg 44
Olanzapina 10 mg

PARODOX 20 mg 45
Paroxetina (como Clorhidrato) 20.00 mg

PARODOX XR 25 mg 45
Paroxetina (como clorhidrato) 25 mg

RADIGEN 1 mg 47
Risperidona 1,00 mg

ZOPERIL 55
Zoplicona 7.5 mg



VADE
MÉ
CUM 20
23

ÍNDICE

ÁREA TERAPÉUTICA

SUPLEMENTOS

AMINOXINE PLUS Aminoácidos con zinc y biotina	10
LACTOFLORA Probióticos y prebióticos	34
LACTOFLORA Probióticos y prebióticos	35
MELATONINA Melatonina 3 mg	40
MOVINOL Colágeno hidrolizado 600 mg	42

MULTIVITAMÍNICOS

APETROL JARABE Ciproheptadina clorhidrato con vitaminas	11
BETA COMPLEX Asociación de Vitaminas B	12
SHOTVIT Multivitamínicos	48
SHOTVIT PROBIÓTICO 3 Multivitamínicos	48
SHOTVIT SILVER Multivitamínicos	29
VITABRAL Ácido glutámico y vitaminas complejo B	55

VITAMINAS

ALTA D 1.000 UI Vitamina D 1.000 UI	09
ALTA D 15.000 UI Vitamina D 15.000 UI	09
ALTA D 50.000 UI Vitamina D 50.000 UI	09
MI VIT C EFERVESCENTE Ácido ascórbico 1.000 mg	40
MI VIT D GOTAS Colecalciferol 200UI/gota	41

VENOTÓNICO

VESNIDAN Diosmina 450 mg Hesperidina 50 mg	54
---	----

AEROGASTROL

METOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPÓXIDO/SIMETICONA



Principio Activo

Clordiazepóxido clorhidrato/
metoclopramida clorhidrato
monohidrato/simeticona

Composición

Clordiazepóxido clorhidrato 5 mg
Metoclopramida clorhidrato
Monohidrato 5 mg
Simeticona 100 mg

Forma Farmacéutica

Cápsula

Indicaciones

Alivio de síntomas como
flatulencia, distensión
postprandial, aerofagia,
meteorismo, hipocinesia
gástrica en personas con
trastornos digestivos
producidos por estrés.

Presentación

20 Cápsulas

Registro Sanitario

F-26652/22

AFTAGEL

GEL TÓPICO BUCAL

BENZOCAÍNA - CETILPIRIDINIO



Principio Activo

Benzocaína - Cetilpiridinio

Composición

Cada 100 g de gel tópico:
Benzocaína 5 g
Cetilpiridinio 0.5 g

Forma Farmacéutica

Gel tópico

Indicaciones

Alivio temporal y sintomático
de las molestias producidas
por pequeñas heridas en la
cavidad bucal.

Presentación

Frasco Gotario con 20 g

Registro Sanitario

F-26585/22



ALTA D COLECALCIFEROL



Principio Activo	Colecalciferol (Vitamina D3)
Composición	1.000, 15.000 y 50.000 UI
Forma Farmacéutica	Cápsulas Blandas
Indicaciones	Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina D.
Presentación	1.000 UI (30 Cápsulas blandas); 15.000 y 50.000 UI (4 Cápsulas blandas)
Registro Sanitario	F-25846/20 F-25908/21 F-25487/20

AMATO TOPIRAMATO



Principio Activo	Topiramato
Composición	25, 50 y 100 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Presentación	60 Comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-19771/23 F-19773/23 F-19772/23

Indicaciones

Topiramato está indicado como terapia coadyuvante en pacientes epilépticos que presenten crisis focales o de inicio focal que luego se generalicen. Topiramato está indicado como monoterapia inicial en pacientes desde 6 años de edad con crisis de inicio parcial o crisis tónico clónicas generalizadas primarias. Topiramato está indicado para la profilaxis de la migraña en pacientes adultos. No ha sido estudiada la utilidad de Topiramato en el tratamiento agudo de migraña. Topiramato está indicado en adultos y niños mayores de 2 años como terapia coadyuvante en el tratamiento de crisis asociadas al síndrome Lennox Gastaut.

AMINOXINE

BIOTINA+AMINOÁCIDOS+ZINC



Principio Activo Biotina+aminoácidos+zinc

Composición Biotina+aminoácidos+zinc

Forma Farmacéutica 1 comp. al día o más por indicación del Profesional de la Salud

Indicaciones

Es una fórmula diseñada para asegurar una óptima suplementación de aminoácidos, zinc y minerales. Aminoxine Plus es un alimento para deportistas y suplemento alimentario. No recomendable para menores de 15 años, en embarazo ni lactancia.

Presentación 60 Cápsulas

Registro Sanitario Suplemento alimenticio

ANFEBUTAMONA

ANFEBUTAMONA



Principio Activo Clorhidrato de anfebutamona

Composición 150 mg / 300 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada

Presentación 30 Comprimidos recubiertos

Registro Sanitario F-26326/21
F-26749/22


Indicaciones

ANFEBUTAMONA 150 mg Trastorno depresivo mayor: Se indica en el tratamiento de episodios depresivos mayores. Después de haber obtenido una respuesta satisfactoria, la continuación de la terapia resulta eficaz para prevenir una recaída. Trastorno afectivo estacional: Está indicado en la prevención de los episodios de depresión mayor estacional en pacientes que tienen diagnóstico de Trastorno Afectivo Estacional.

ANFEBUTAMONA 300 mg Tratamiento de episodios depresivos graves: Después de haber obtenido una respuesta satisfactoria, la continuación de la terapia con Anfebutamona de liberación prolongada resulta eficaz para prevenir una recaída. Trastorno afectivo estacional: Anfebutamona de liberación prolongada esta indicada en la prevención de los episodios de depresión mayor estacional en pacientes que tienen diagnóstico de trastorno afectivo estacional.

ANTROFI

PROMESTRIENO



Principio Activo	Promestrieno
Composición	Cada gramo de crema contiene Promestrieno 10,00 mg
Forma Farmacéutica	Crema vaginal
Indicaciones	Indicado para el tratamiento de trastornos tróficos vulvovaginales.
Presentación	30 gramos + 20 aplicadores
Registro Sanitario	F-21469/19

APETROL

CIPROHEPTADINA/TIAMINA/PIRIDOXINA/RIBOFLAVINA/
NICOTINAMIDA/ÁCIDO ASCÓRBICO



Principio Activo	Ciproheptadina clorhidrato/ Tiamina/Piridoxina/Riboflavina/ Nicotinamida/Ácido Ascórbico
Composición	Ciproheptadina clorhidrato/ Tiamina/Piridoxina/Riboflavina/ Nicotinamida/Ácido Ascórbico
Forma Farmacéutica	Jarabe
Indicaciones	Anorexia o falta de apetito relacionado con atraso del desarrollo en el organismo infantil. Anorexia en estados de astenia y convalecencia en general.
Presentación	120 mL
Registro Sanitario	F-7765/21

BETA COMPLEX

VITAMINAS B1, B2 ,B6



Principio Activo	Vitaminas B1, B2 ,B6
Composición	Vitaminas B1, B2 ,B6 y niacina necesarios, ya que participan en la obtención de energía para el organismo a partir de los macronutrientes.
Forma Farmacéutica	Complejo de Vitamina B
Presentación	30 Cápsulas
Registro Sanitario	Suplemento

Indicaciones

Beta Complex (Asociación de Vitaminas B) es una fórmula farmacéutica equilibrada, que asegura los requerimientos de vitaminas B1, B2 ,B6 y niacina necesarios, ya que participan en la obtención de energía para el organismo a partir de los macronutrientes. Su presentación en cápsulas de gelatina, aseguran su óptima biodisponibilidad. Beta Complex (Asociación de Vitaminas B) en cápsulas es un suplemento alimentario. No es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza una alimentación balanceada.

BETAVOL

BETAMETASONA (DIPROPIONATO)
BETAMETASONA (FOSFATO DISÓDICO)



Principio Activo	Betametasona (como Dipropionato) + Betametasona (como Fosfato Disódico)
Composición	5 + 2 mg/mL
Forma Farmacéutica	Suspensión Inyectable
Indicaciones	Tratamiento de patologías agudas o crónicas susceptibles a los corticosteroides.
Presentación	1 ampolla con 1 mL de suspensión + 1 jeringa esterilizada con sistema de seguridad
Registro Sanitario	F-19634/22

BETINA 16 mg

BETAHISTINA DICLORHIDRATO



Principio Activo Betahistina diclorhidrato

Composición Betahistina como diclorhidrato

Forma Farmacéutica Oral

Indicaciones Indicado en desórdenes patológicos por déficit microcirculatorio en el laberinto: vértigo, tinitus, pérdida de la audición asociada al Síndrome de Menière y condiciones vertiginosas correlacionadas.

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-21443/14

BETINA 24 mg

BETAHISTINA DICLORHIDRATO



Principio Activo Betahistina diclorhidrato

Composición Betahistina como diclorhidrato

Forma Farmacéutica Oral

Indicaciones Indicado en desórdenes patológicos por déficit microcirculatorio en el laberinto: vértigo, tinitus, pérdida de la audición asociada al Síndrome de Menière y condiciones vertiginosas correlacionadas.

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-21442/14

BILATEN D

CANDESARTÁN+HIDROCLOROTIAZIDA



Principio Activo	Candesartán cilexetilo + Hidroclorotiazida
Composición	16 mg + 12.5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Tratamiento de la hipertensión arterial esencial donde no resulta suficiente una monoterapia con candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-12803/23

BISOPRIL

BISOPROLOL



Principio Activo	Bisoprolol fumarato
Composición	1,25 mg, 2,5 mg y 5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Tratamiento de la Hipertensión arterial y cardiopatía coronaria. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica estable de moderada a severa, con función ventricular sistólica reducida y en asociación con inhibidores ECA y diuréticos y, opcionalmente, glucósidos cardíacos.
Presentación	30 Comprimidos Recubiertos
Registro Sanitario	F-27152/22 F-27153/22 F-27135/22



BROPAVOL JARABE

BROMHEXINA



Principio Activo	Bromhexina clorhidrato
Composición	Cada 5 mL de jarabe contiene Bromhexina clorhidrato 8 mg
Forma Farmacéutica	Jarabe
Presentación	Frasco con 100 mL
Registro Sanitario	F-26275/21

Indicaciones

Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica o causada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

BUTRINO

ANFEBUTAMONA



Principio Activo	Anfebutamona
Composición	150 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos de liberación prolongada
Indicaciones	El Clorhidrato de Bupropiona está indicado en el tratamiento de la depresión. El Clorhidrato de Bupropiona también está indicado como adyuvante en el tratamiento de cese del tabaquismo.
Presentación	30 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-19319/22

B B Bioequivalente

BUTRINO XL

ANFEBUTAMONA CLORHIDRATO



Principio Activo	Anfebutamona Clorhidrato
Composición	150 mg / 300 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos de liberación prolongada
Presentación	30 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-26128/21 F-26750/22

Indicaciones

Butrino XL 150 mg Se indica el clorhidrato de anfebutamona en el tratamiento de episodios depresivos mayores o en la prevención de recaídas y recurrencias de episodios depresivos después de la respuesta inicial satisfactoria. También está indicado en la prevención de los episodios de depresión mayor estacional en pacientes que tienen diagnóstico de Trastorno Afectivo Estacional.

Butrino XL 300 mg Tratamiento de episodios depresivos graves. Después de haber obtenido una respuesta satisfactoria, la continuación de la terapia con Anfebutamona de liberación prolongada resulta eficaz para prevenir una recaída. Trastorno Afectivo Estacional: Anfebutamona de liberación prolongada está indicada en la prevención de los episodios de depresión mayor estacional en pacientes que tienen diagnóstico de trastorno afectivo estacional.



CLAVAM DUO

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO



Principio Activo	Amoxicilina/Ácido Clavulánico
Composición	875mg/125mg - 400mg/57mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos / Polvo Para Suspensión Oral
Presentación	14 - 20 comprimidos / 70 mL
Registro Sanitario	F-19292/22 F-19418/22

Indicaciones

Clavam Duo 875mg + 125mg Indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas por cepas productoras de betalactamasas, del tracto respiratorio (incluyendo oído y nariz), del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal y osteomielitis, causados por organismos sensibles a la asociación determinado por antibiograma.

Clavam Duo 400mg + 57mg Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de la piel, tejidos blandos, sepsis intra-abdominal, osteomielitis producidas por microorganismos sensibles y productores de betalactamasas demostrados por antibiograma.

CLODAVAN

CLOBETASOL



Principio Activo Clobetasol propionato

Composición 0,05 g cada 100 mL solución tópica

Forma Farmacéutica Solución Tópica

Indicaciones

Tratamiento a corto plazo de dermatosis del cuero cabelludo sensibles a esteroides, como psoriasis o eczema recalcitrante, que no responden a corticoides menos activos.

Presentación 30 mL

Registro Sanitario F-26627/22

CLODAVAN

CLOBETASOL



Principio Activo Clobetasol

Composición 0,05 g x 100 g

Forma Farmacéutica Crema Tópica

Indicaciones

Tratamiento a corto plazo de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de dermatosis que no responden a corticosteroides tópicos menos activos.

Presentación 30 g

Registro Sanitario F-26464/21

CLOTRIMIN

CLOTRIMAZOL



Principio Activo	Clotrimazol
Composición	500 mg
Forma Farmacéutica	Cápsula blanda vaginal
Indicaciones	Tratamiento tópico de infecciones vulvo vaginales producidas por <i>Candida albicans</i> .
Presentación	1 Cápsula blanda vaginal
Registro Sanitario	F-7515/21

CLOTRIMIN B

CLOTRIMAZOL/BETAMETASONA



Principio Activo	Clotrimazol/Betametasona
Composición	1 g + 0,06 g
Forma Farmacéutica	Crema Tópica
Indicaciones	Tratamiento tópico de infecciones micóticas complicadas con inflamación y prurito, causadas por hongos del género <i>Trichophyton</i> , <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum canis</i> , <i>Candida albicans</i> y <i>Malasszeria furfur</i> .
Presentación	15 g
Registro Sanitario	F-26323/21



COQUES

CELECOXIB



Principio Activo Celecoxib

Composición 200 mg

Forma Farmacéutica Cápsula

Indicaciones Tratamiento sintomático de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Alivio de los signos y síntomas de la espondilitis anquilosante. Manejo del dolor agudo. Tratamiento de la dismenorrea primaria.

Presentación 10 - 20 Cápsulas

Registro Sanitario F-23842/23

CORTIGRIP

DÍA/NOCHE

CLORFENAMINA/PARACETAMOL/PSEUDOEFEDRINA



Principio Activo DÍA: Paracetamol/
Pseudoefedrina clorhidrato
NOCHE: Paracetamol/
Pseudoefedrina clorhidrato/
Clorfenamina maleato

Composición DÍA: Paracetamol 500 mg/
Pseudoefedrina clorhidrato 30 mg
NOCHE: Paracetamol 500 mg/
Pseudoefedrina clorhidrato 30 mg/
Clorfenamina maleato 4 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos recubiertos

Indicaciones Alivio sintomático del resfrío común, estados gripales o malestar general provocado por congestión alérgica.

Presentación 10 comprimidos recubiertos día /
5 comprimidos recubiertos noche

Registro Sanitario F-26469/21



DALUN

HIDROXIZINA



Principio Activo	Hidroxizina
Composición	20 mg
Forma Farmacéutica	Comprimido

Indicaciones

DALUN comprimidos está indicado para el alivio sintomático de la ansiedad y tensión asociada con la psiconeurosis y como medicamento complementario en enfermedades orgánicas en que se manifieste ansiedad. DALUN comprimidos es útil en el manejo del prurito debido a condiciones alérgicas tales como urticaria crónica, dermatosis de contacto y atópicas, y en prurito mediado por histamina. También se utiliza como un sedante en la premedicación anestésica y después de la anestesia general.

Presentación	20 Comprimidos
Registro Sanitario	F-7925/21



DERMALIV

BENZOCAÍNA/MENTOL/TRICLOSAN/ ALCANFOR



Principio Activo	Benzocaína/Mentol/ Triclosan/ Alcanfor
Composición	Benzocaína, Triclosan, Mentol, Alcanfor
Forma Farmacéutica	Benzocaína 1,000 g, Triclosan 0,200 g, Mentol 0,375 g, Alcanfor 0,097g
Indicaciones	Está indicado para aliviar el dolor y molestias de quemaduras leves (causadas por el sol u otros agentes) o heridas menores de la piel. También se utiliza para el alivio de picaduras de insectos y en caso de prurito
Presentación	Envase como con 25 g de crema
Registro Sanitario	F-20928/19

DESDOL

PARACETAMOL+CLORZOAZONA



Principio Activo	Paracetamol+ Clorzoxazona
Composición	300 mg + 250 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Tratamiento del dolor asociado a espasmo muscular en los trastornos musculo esqueléticos agudos.
Presentación	20 Comprimidos Recubiertos
Registro Sanitario	F-20602/18

DESTREL

DESOGESTREL



Principio Activo	Desogestrel
Composición	0,075 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Anticonceptivo oral selectivo para ser usado durante el periodo de lactancia o cuando los estrógenos están contraindicados.
Presentación	Estuche 28 comprimidos
Registro Sanitario	F-23512/22

DESVENLAFAXINA

DESVENLAFAXINA



Principio Activo	Desvenlafaxina
Composición	50 mg / 100 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos de liberación prolongada
Indicaciones	Tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM).
Presentación	30 Comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-24402/18 F-24373/18

DEUCOTOS

CLORFENAMINA/CODEÍNA
PSEUDOEFEDRINA



Principio Activo	Clorfenamina/Codeína/ Pseudoefedrina
Composición	Cada 5 mL contiene: Clorfenamina 0,5 mg + Codeína 10 mg + Pseudoefedrina 0,5 mg
Forma Farmacéutica	Jarabe
Indicaciones	Tratamiento de la tos de diversa etiología, especialmente la asociada a procesos respiratorios y bronquiales del adulto y niños mayores de 12 años y en la tos asociada a estados gripales y resfríos.
Presentación	120 mL
Registro Sanitario	F-25331/20

DEUCODOL FORTE

IBUPROFENO



Principio Activo	Ibuprofeno
Composición	Cada 5 mL suspensión oral contiene: Ibuprofeno 200 mg.
Forma Farmacéutica	Suspensión oral
Indicaciones	Alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.
Presentación	120 mL de suspensión oral
Registro Sanitario	F-25702/20

DICLAC GEL

DICLOFENACO



Principio Activo Diclofenaco

Composición Diclofenaco Dietilamónico 1,2 g

Forma Farmacéutica Gel tópico

Indicaciones

Formas localizadas de reumatismo extra-articular, tales como: tenosinovitis, síndrome hombro-mano, bursitis, periartropatías. Afecciones reumáticas localizadas: artrosis de las articulaciones periféricas y de la columna vertebral. Inflamaciones de origen traumático de los tendones, ligamentos, músculos y articulaciones: contusiones, entorsis, distensiones.

Presentación Pomo con 60 g

Registro Sanitario F-26521/21

DIRTOP

SILDENAFILO



Principio Activo Sildenafil

Composición 50 mg / 100 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos

Presentación 1 - 20 Comprimidos/
5 Comprimidos

Registro Sanitario F-19498/22
F-22584/21

Indicaciones

Dirtop 50 mg/ Dirtop 100 mg
Tratamiento de la disfunción
eréctil.

DOLOSTAT BI

KETOPROFENO



Principio Activo	Ketoprofeno
Composición	150 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Liberación Prolongada
Presentación	10 Comprimidos LP
Registro Sanitario	F-26971/22

Indicaciones

Dolostat BI está indicado para el tratamiento de:

- Artritis reumatoide. - Enfermedades articulares degenerativas
- Alteraciones músculo - esqueléticas y articulares tales como tendinitis, esguinces.
- Dolor de otros orígenes, como dolor dental, cefalea y dismenorrea primaria.

Dolostat BI está indicado además para el tratamiento de la crisis de migraña con o sin aura.

DUOMO

DOXAZOSINA



Principio Activo	Doxazosina
Composición	4 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	30 comprimidos
Registro Sanitario	F-25371/20

Indicaciones

Hipertensión arterial (HTA):


Doxazosina está indicado en el tratamiento de la hipertensión y puede ser utilizado como agente inicial para controlar la presión arterial en la mayoría de los pacientes. En pacientes que no están adecuadamente controlados con un solo agente antihipertensivo, Duomo puede ser usado en combinación con otros agentes como diurético tiazídico, un betabloqueador, un antagonista de calcio o cualquier inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.

Hiperplasia prostática benigna (HPB):

Duomo está indicado para el tratamiento de la obstrucción del flujo urinario y de los síntomas asociados con la hiperplasia prostática benigna (HPB). La doxazosina puede utilizarse en pacientes con HPB tanto hipertensos como normotensos. Mientras que los cambios en la presión arterial en pacientes normotensos con HPB, son clínicamente insignificantes. Los pacientes que presentan tanto hipertensión como HPB han sido eficazmente tratados, utilizando doxazosina como tratamiento único.

DUOMO HP

DOXAZOSINA+FINASTERIDA



Principio Activo	Doxazosina + Finasterida
Composición	2 mg + 5 mg
Forma Farmacéutica	Cápsulas
Presentación	30 cápsulas duras
Registro Sanitario	F-26054/21

Indicaciones

El producto Duomo HP (doxazosina + finasterida) está indicado para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) y los síntomas relacionados con la enfermedad, tales como síntomas obstructivos (dificultad, interrupción, goteo, flujo débil de orina, vaciado incompleto de la vejiga), síntomas irritativos [aumento de la frecuencia urinaria (incluso durante la noche), urgencia, ardor], para la reducción del riesgo de retención aguda de orina y reducción de riesgos de intervenciones quirúrgicas, tales como remoción de la próstata.

ESC

ESCITALOPRAM OXALATO



Principio Activo	Escitalopram
Composición	10 mg / 20 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-26480/21 F-26481/21

Indicaciones

El escitalopram está indicado para:

- Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída.
- Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia.
- Tratamiento de la fobia social.
- Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada.
- Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

EURODERM

MOMETASONA



Principio Activo Mometasona Furoato

Composición Cada 100 g de crema contiene Mometasona Furoato 0,100 g

Forma Farmacéutica Crema Tópica

Indicaciones

Alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis corticosenibles, como es el caso de la dermatitis atópica, dermatitis alérgica de contacto y psoriasis.

Presentación 15 g

Registro Sanitario F-26382/21

FEMIPLUS 20 CD

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL



Principio Activo Drospirenona + Etinilestradiol

Composición 3 mg + 0,02 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos recubiertos

Indicaciones

Anticonceptivo oral. Tratamiento del acné vulgaris moderado en mujeres que eligen utilizar anticoncepción oral. Tratamiento de los síntomas del TDPM (trastorno disfórico premenstrual) en mujeres que eligen utilizar anticoncepción oral.

Presentación Estuche 28 comprimidos (24 activos + 4 placebos)

Registro Sanitario F-26826/22

FEMIPLUS CD

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL



Principio Activo	Drospirenona + Etinilestradiol
Composición	3 mg + 0,03 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Anticonceptivo oral
Presentación	Estuche 28 comprimidos (21 activos + 7 placebos)
Registro Sanitario	F-26827/22

FESANIL

LEVODROPROPIZINA



Principio Activo	Levodropropizina
Composición	30 mg/5 mL
Forma Farmacéutica	Jarabe
Indicaciones	Tratamiento sintomático de la tos no productiva. Antitusígeno.
Presentación	120 mL
Registro Sanitario	F-24075/18

FINDALER

CETIRIZINA



Principio Activo	Cetirizina diclorhidrato
Composición	10 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Adultos y niños de 6 meses en adelante: Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica perenne y tratamiento del prurito y de la urticaria idiopática crónica. Adultos y niños de 2 años en adelante: Tratamiento sintomático de la rinitis y de conjuntivitis estacionales.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-21819/20

FINDALER

CETIRIZINA



Principio Activo	Cetirizina diclorhidrato
Composición	5 mg/5 mL
Forma Farmacéutica	Jarabe
Presentación	100 mL
Registro Sanitario	F-25748/20



Indicaciones

Rinitis alérgica estacional: cetirizina está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional debido a alérgenos como la ambrosía, hierba y pólenes de árboles en adultos y niños mayores de 2 años. Los síntomas tratados eficazmente incluyen estornudos, rinorrea, prurito nasal, prurito ocular, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos.

Rinitis alérgica perenne: cetirizina está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica perenne debido a alérgenos como los ácaros del polvo, la caspa de animales y el moho en adultos y niños mayores de 6 meses. Los síntomas tratados de manera efectiva incluyen estornudos, rinorrea, secreción postnasal, prurito nasal, prurito ocular y lagrimeo.

Urticaria crónica: cetirizina está indicado para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas de la urticaria idiopática crónica en adultos y niños de 6 meses de edad y mayores. Reduce significativamente la aparición, la gravedad y la duración de la urticaria y reduce significativamente el prurito.

FINDER

KETOCONAZOL



Principio Activo	Ketoconazol
Composición	Ketoconazol 2g
Forma Farmacéutica	Shampoo
Indicaciones	Ketoconazol shampoo 2% está indicado para el tratamiento tópico de la dermatitis seborreica y pityriasis versicolor del cuero cabelludo, manifestada principalmente por la caspa del cabello.
Presentación	Shampoo al 2 %
Registro Sanitario	F-26325/21

GESIDOL

JARABE INFANTIL

PARACETAMOL



Principio Activo	Paracetamol
Composición	120 mg/5 mL
Forma Farmacéutica	Jarabe
Indicaciones	Tratamiento sintomático de estados dolorosos leves a moderados y estados febriles.
Presentación	Jarabe 120 mg/5 mL
Registro Sanitario	F-23920/18

GESIDOL INFANTIL SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

PARACETAMOL



Principio Activo	Paracetamol
Composición	100 mg/mL
Forma Farmacéutica	Solución para gotas orales
Indicaciones	Tratamiento sintomático de estados dolorosos y febriles leves a moderados.
Presentación	15 mL
Registro Sanitario	F-24178/18

GESIDOL PARACETAMOL



Principio Activo	Paracetamol
Composición	1000 mg
Forma Farmacéutica	Comprimido
Indicaciones	Tratamiento sintomático del dolor leve a moderado y estados febriles.
Presentación	20 comprimidos
Registro Sanitario	F-23750/23

GESIDOL MUJER

MEPIRAMINA/PAMABROM/PARACETAMOL



Principio Activo	Paracetamol/Pamabrom/Mepiramina maleato
Composición	Paracetamol 500 mg Pamabrom 25 mg Mepiramina maleato 15 mg
Forma Farmacéutica	Comprimido
Indicaciones	Alivio sintomático del síndrome premenstrual.
Presentación	10 comprimidos
Registro Sanitario	F-27518/23

GESIPROCT CREMA RECTAL

LIDOCAÍNA/TRIBENÓSIDO



Principio Activo	Lidocaína/Tribenósido
Composición	Cada 100 g de crema contiene: Tribenósido 5.0 g; Lidocaína Clorhidrato 2.0 g
Forma Farmacéutica	Crema rectal
Indicaciones	Tratamiento local de hemorroides internos y externos.
Presentación	pomo con 30 g de crema
Registro Sanitario	F-26056/21

GINNA

NITRATO DE FENTICONAZOL



Principio Activo	Nitrato de fenticonazol
Composición	Nitrato de fenticonazol 2,00 g
Forma Farmacéutica	Crema
Indicaciones	El nitrato de fenticonazol es un antifúngico indicado para el tratamiento de infecciones vaginales por hongos. Ginna se indica para el tratamiento de candidiasis de la mucosa vaginal (vulvovaginitis, vaginitis y leucorrea).
Presentación	Crema vaginal de 40 gramos + 7 aplicadores desechables
Registro Sanitario	F-26676/22

HOLMES H

OLMESARTÁN+HIDROCLOROTIAZIDA



Principio Activo	Olmesartán+Hidroclorotiazida
Composición	20 mg + 12,5 mg y 40 mg + 12,5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Tratamiento de la hipertensión arterial cuando la monoterapia con olmesartán o hidroclorotiazida por sí solos no son suficientes para controlar adecuadamente la presión arterial.
Presentación	30 Comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-22026/20 F-24754/19

KALITIUM

CARBONATO DE LITIO



Principio Activo	Carbonato de Litio
Composición	300 mg / 450 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos / Comprimidos de liberación prolongada
Indicaciones	Indicado en el tratamiento y terapia de mantención de los episodios maníacos de la enfermedad bipolar tipo I y II en pacientes mayores de 12 años.
Presentación	50 / 30 comprimidos
Registro Sanitario	F-25996/21 F-26737/22

LACTOFLORA

POLVO PARA SUSPENSIÓN

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS

Principio Activo	Probióticos y prebióticos
Composición	2.5 billones de UFC (Unidades Formadoras de Colonias)
Forma Farmacéutica	Polvo para suspensión – Vía oral
Indicaciones	Probióticos y prebióticos
Presentación	10 Sachets de 1 g
Registro Sanitario	Suplemento



LACTOFLORA

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS



Principio Activo	Probióticos y prebióticos
Composición	5 billones de UFC
Forma Farmacéutica	Cápsulas
Indicaciones	Probióticos y prebióticos
Presentación	30 Cápsulas
Registro Sanitario	Suplemento

LETICO

LAMOTRIGINA




Principio Activo	Lamotrigina
Composición	25 mg / 50 mg / 100 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-21014/19 F-21137/19 F-26876/22

Indicaciones

1.- Epilepsia: Uso combinado: Lamotrigina está indicada como terapia adjunta en crisis parciales en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. También está indicada como terapia adjunta en las crisis generalizadas, incluidas las convulsiones tónico-clónicas y las asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Uso en monoterapia: Lamotrigina está indicada en monoterapia en pacientes adultos con crisis parciales, en las crisis generalizadas incluidas las convulsiones tónico-clónicas y las asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut y que están en tratamiento con un solo medicamento anticonvulsivante inductor enzimático. La seguridad y eficacia de lamotrigina no se ha establecido en los siguientes casos: monoterapia inicial en conversión a monoterapia a partir del tratamiento de un anticonvulsivante no inductor enzimático, como por ejemplo, valproato; para conversión simultánea a monoterapia a partir de un tratamiento previo con dos o más medicamentos anticonvulsivantes y en pacientes menores de 16 años, a excepción de aquellos con crisis parciales y crisis generalizadas asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut. 2.- Trastorno Bipolar: Lamotrigina está indicada para el tratamiento de mantención del desorden bipolar tipo I, en adultos y mayores de 18 años, para disminuir la frecuencia de aparición de trastornos del ánimo (depresión, manía, hipomanía, episodios mixtos).

LEVOXIN

LEVOFLOXACINO



Principio Activo Levofloxacin

Composición 750 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos recubiertos

Indicaciones

Tratamiento en adultos de infecciones bacterianas sensibles a levofloxacin: sinusitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, infecciones complicadas del tracto urinario incluyendo pielonefritis, infecciones de la piel y tejidos blandos, neumonía nosocomial y prostatitis.

Presentación 10 Comprimidos

Registro Sanitario F-22408/21

LIMIAR

PREGABALINA



Principio Activo Pregabalina

Composición 75 mg / 150 mg

Forma Farmacéutica Cápsulas

Presentación 30 Cápsulas

Registro Sanitario F-26115/21
F-26116/21

Indicaciones

*Dolor Neuropático. Pregabalina está indicada para el tratamiento del dolor neuropático en adultos. *Epilepsia. Pregabalina está indicada como terapia adyuvante de las crisis parciales, con o sin generalización secundaria, en pacientes adultos. *Trastorno de Ansiedad Generalizada. Pregabalina está indicada para el Tratamiento de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en adultos. *Fibromialgia. Pregabalina está indicada para el manejo del síndrome de fibromialgia.

LUCASTE

MONTELUKAST



Principio Activo Montelukast

Composición 4 mg

Forma Farmacéutica Granulado Oral

Presentación 30 Sobres

Registro Sanitario F-24805/19

LUCASTE

MONTELUKAST



Principio Activo Montelukast

Composición 4 y 5 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos masticables

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-20588/18
F-20589/18

LUCASTE

MONTELUKAST



Principio Activo Montelukast

Composición 10 mg

Forma Farmacéutica Comprimido recubierto

Presentación 30 Comprimidos recubiertos

Registro Sanitario F-24348/18

Indicaciones

Lucaste 4, 5, 10 mg Lucaste (Montelukast) está indicado en pacientes adultos y pediátricos de 12 meses de edad o mayores para la profilaxis y tratamiento crónico del asma y para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores y rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y mayores. Montelukast está indicado para el alivio de los síntomas de rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y mayores). Reservar su uso para pacientes que tienen una respuesta inadecuada o intolerancia a otros tratamientos.

LUGANO 12/250

FORMOTEROL FUMARATO
+ FLUTICASONA PROPIONATO



Principio Activo Formoterol Fumarato + Fluticasona Propionato

Composición 12 mcg + 250 mcg

Forma Farmacéutica Polvo para inhalación en cápsulas

Indicaciones

Lugano (Fumarato de Formoterol dihidratado + Propionato de Fluticasona) está indicado para el tratamiento de adultos y niños mayores de 12 años con asma, en los casos en que el uso de una combinación (corticosteroides inhalados con un beta-2 agonista de acción prolongada) es apropiado

Presentación 60 Cápsulas Inhalatorias

Registro Sanitario F-26155/21

MAITE

CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL



Principio Activo Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol

Composición 2 mg + 0,03 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos recubiertos

Indicaciones

Prevención del embarazo y es útil para tratar signos de androgenización tales como el acné.

Presentación Estuche 21 comprimidos

Registro Sanitario F-23559/22

MAREAMIN

DIMENHIDRINATO



Principio Activo	Dimenhidrinato
Composición	100 mg
Forma Farmacéutica	Comprimido
Indicaciones	Se utiliza para evitar el mareo producido por el movimiento.
Presentación	20 Comprimidos
Registro Sanitario	F-25769/20

MEDAZOL

METRONIDAZOL



Principio Activo	Metronidazol
Composición	Cada 100 g de gel contiene 0,75 g metronidazol
Forma Farmacéutica	Gel Tópico
Indicaciones	Tratamiento tópico en la reducción de la sintomatología clínica del acné de rosácea en su forma moderada o severa (pápulas, pústulas y eritema).
Presentación	30 g
Registro Sanitario	F-25759/20

MELATONINA

MELATONINA



Principio Activo Melatonina

Composición 3 mg

Forma Farmacéutica Comprimido

Indicaciones Está indicado para el tratamiento a corto plazo del insomnio primario (dificultad persistente para conciliar el sueño o para permanecer dormido o por mala calidad del sueño) en pacientes mayores de 55 años.

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-25847/20

MI VIT C EFERVESCENTES

VITAMINA C

Principio Activo Ácido ascórbico

Composición 1000 mg

Forma Farmacéutica Tableta efervescente

Presentación 10 Tabletas efervescentes
1000 mg

Registro Sanitario Suplemento



MI VIT D GOTAS

VITAMINA D



Principio Activo	Colecalciferol
Composición	200 UI / Gota
Forma Farmacéutica	Gotas - Vía oral
Presentación	10 mL
Registro Sanitario	Suplemento

MIO RELAX

CICLOBENZAPRINA



Principio Activo	Ciclobenzaprina clorhidrato
Composición	10 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Alivio de espasmos musculares asociados a condiciones agudas dolorosas del músculo esquelético.
Presentación	20 Comprimidos
Registro Sanitario	F-25395/20

MONTELUKAST

MONTELUKAST



Principio Activo Montelukast

Composición 10 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos Recubiertos

Indicaciones En pacientes adultos y pediátricos de 12 meses de edad o mayores para la profilaxis y tratamiento crónico del asma. Está indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y mayores).

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-24361/18

MOVINOL

COLÁGENO

- Principio Activo** Colágeno hidrolizado
- Composición** 600 mg por cada Cápsula
- Forma Farmacéutica** Cápsula
- Presentación** 60 Cápsulas de Colágeno
- Registro Sanitario** Suplemento



OLANZAPINA

OLANZAPINA



Principio Activo	Olanzapina
Composición	5 mg / 10 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-24576/19 F-26992/22

Indicaciones

Olanzapina 5 mg Olanzapina está indicada para el tratamiento agudo y de control de la esquizofrenia y otros trastornos mentales (psicosis) donde se presentan síntomas positivos (ej.: delirios, alucinaciones, alteraciones del pensamiento, hostilidad y desconfianza) y/o síntomas negativos (ej.: hostilidad, aislamiento emocional y social, problemas de lenguaje) prominentes. La Olanzapina alivia también los síntomas afectivos secundarios comúnmente asociados con la esquizofrenia y trastornos relacionados. La Olanzapina, en monoterapia o en combinación con litio o valproato, está indicado para el tratamiento de episodios de manía aguda o episodios mixtos del trastorno bipolar, con o sin síntomas psicóticos y con o sin ciclo rápido. La Olanzapina está indicada para prolongar el tiempo entre los episodios y reducir las tasas de recurrencia de los episodios de manía, mixtos o depresivos en trastorno bipolar.

Olanzapina 10 mg Olanzapina está indicada en el tratamiento de la esquizofrenia. Olanzapina es efectiva en el mantenimiento de la mejoría clínica durante la terapia de continuación en los pacientes que muestran una respuesta terapéutica inicial. La olanzapina está indicada como monoterapia en el tratamiento agudo de episodios maníacos o mixtos asociados con trastorno bipolar tipo I, y el tratamiento de mantenimiento de trastorno bipolar tipo I. La olanzapina está indicada como terapia adyuvante a Litio o Valproato para el tratamiento de episodios maníacos o mixtos asociados con trastorno bipolar tipo I.

OLMESARTÁN

OLMESARTÁN



Principio Activo	Olmesartán medoxomilo
Composición	20 mg / 40 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Tratamiento de la hipertensión. Puede ser usado como monoterapia o en combinación con otros agente antihipertensivos.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-26037/21 F-25976/21

OLMESARTÁN + HIDROCLOROTIAZIDA

OLMESARTÁN+HIDROCLOROTIAZIDA



Principio Activo Olmesartán medoxomilo + Hidroclorotiazida

Composición 40 mg/12,5 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos Recubiertos

Indicaciones

Tratamiento de la hipertensión cuando la monoterapia con Olmesartán medoxomilo o Hidroclorotiazida, por si solos, no son suficientes para controlar adecuadamente la presión arterial.

Presentación 30 Comprimidos

Registro Sanitario F-26707/22

PANTOCAL

PANTOPRAZOL



Principio Activo Pantoprazol

Composición 40 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos Recubiertos con Recubrimiento entérico

Indicaciones

Tratamiento de la úlcera duodenal. Úlcera gástrica. Esofagitis por reflujo gastroesofágico moderado a severo. Erradicación del helicobacter pylori en combinación con tratamiento de antibióticos adecuado.

Presentación 28 Comprimidos

Registro Sanitario F-20679/18

PARODOX

PAROXETINA



Principio Activo	Paroxetina clorhidrato
Composición	20 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos

Indicaciones

Clorhidrato de Paroxetina está indicado para el tratamiento de los síntomas de la depresión incluyendo depresión reactiva y severa y la acompañada por ansiedad. Clorhidrato de Paroxetina también está indicado para el tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad social (fobia social), para el tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia de las crisis de pánico con o sinV agorafobia, en el trastorno de ansiedad generalizada (T.A.G), y en el tratamiento de estrés post traumático (T.E.P.T)

Presentación	30 comprimidos
Registro Sanitario	F-19318/22

PARODOX XR

PAROXETINA



Principio Activo	Paroxetina clorhidrato
Composición	25 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos con Recubrimiento entérico de liberación prolongada
Indicaciones	Trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno disfórico premenstrual (TDPM). Tratamiento de ansiedad social/fobia social.
Presentación	30 comprimidos
Registro Sanitario	F-25937/21



PIETRA ED

DIENOGEST



Principio Activo	Dienogest
Composición	2 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Tratamiento de la endometriosis.
Presentación	Estuche 30 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-22997/21

PROCION

PREDNISONA



Principio Activo	Prednisona
Composición	20 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Indicaciones	Tratamiento de variadas enfermedades endocrinas, osteomusculares del colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, neoplásicas y de otros tipos con respuesta conocida al tratamiento con corticoides.
Presentación	20 Comprimidos
Registro Sanitario	F-12227/22

RADIGEN

RISPERIDONA



Principio Activo	Risperidona
Composición	1 mg/mL
Forma Farmacéutica	Solución oral

Indicaciones

Tratamiento agudo y de mantenimiento de la esquizofrenia. Como monoterapia para el tratamiento a corto plazo de la manía aguda episodios mixtos asociados a desorden bipolar y como terapia adyuvante a estabilizadores de ánimo en el manejo de episodios maniáticos agudos o mixtos en trastorno bipolar.

Presentación	30 mL
Registro Sanitario	F-24690/19

REDUX

FENTERMINA



Principio Activo	Fentermina
Composición	37,5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos

Indicaciones

Tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios, en pacientes con Índice de Masa Corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg/m² o mayor o igual a 27 kg/m² en presencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias.

Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-27151/22

SHOTVIT MULTIVITAMÍNICOS

Principio Activo	Multivitamínicos
Composición	Multivitamínicos
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	Suplemento



SHOTVIT PROBIÓTICO

MULTIVITAMÍNICOS

Principio Activo	Multivitamínicos
Composición	Multivitamínicos + Probióticos
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	Suplemento

SHOTVIT SILVER

MULTIVITAMÍNICOS

Principio Activo	Multivitamínicos
Composición	Multivitamínicos
Forma Farmacéutica	Comprimidos
Presentación	60 Comprimidos
Registro Sanitario	Suplemento



SOP

CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL



Principio Activo Acetato Ciproterona + Etinilestradiol

Composición 2 mg + 0,035 mg

Forma Farmacéutica Comprimidos recubiertos

Indicaciones

Tratamiento de trastornos andrógeno dependientes en la mujer, tales como el acné, especialmente en las formas pronunciadas y en aquellas acompañadas de seborrea, inflamaciones o formación de nódulos (acné papulopustuloso, acné noduloquístico); alopecia androgénica; y casos leves de hirsutismo.

Presentación Estuche 21 comprimidos recubiertos

Registro Sanitario F-19739/23

SUCRALMAX

SUCRALFATO



Principio Activo Sucralfato

Composición 1 g/5 mL

Forma Farmacéutica Suspensión oral

Indicaciones

Úlcera gástrica y duodenal evolutivas. Tratamiento preventivo de úlcera duodenal reincidente.

Presentación 180 mL

Registro Sanitario F-26636/22



TADALAFILO

TADALAFILO



Principio Activo	Tadalafilo
Composición	5 mg / 20 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Presentación	1- 4 / 30 comprimidos
Registro Sanitario	F-22294/20 F-22182/20

Indicaciones

Tadalafilo 5 mg: 1.-Tadalafilo está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.
2.-Este medicamento está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) en hombres adultos incluyendo aquellos con disfunción eréctil.

Tadalafilo 20 mg: Tadalafilo está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Para que Tadalafilo sea efectivo es necesaria la estimulación sexual.

TÁMISA 20/75

GESTODENO + ETINILESTRADIOL



Principio Activo	Gestodeno + Etinilestradiol
Composición	75 mcg + 20 mcg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Gestodeno + Etinilestradiol está indicado en la prevención del embarazo.
Presentación	Estuche 21 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-19668/22

TÁMISA 30/75

GESTODENO + ETINILESTRADIOL



Principio Activo	Gestodeno + Etinilestradiol
Composición	75 mcg + 30 mcg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Anticoncepción
Presentación	Estuche 21 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-19669/22



TIRIZ

LEVOCETIRIZINA



Principio Activo	Diclorhidrato de Levocetirizina
Composición	5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Indicaciones	Alivio de los síntomas asociados a Rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 2 años y más, Rinitis alérgica perenne (en adultos y niños desde los 6 meses de edad) y para el tratamiento de manifestaciones cutáneas no complicadas relacionadas con la urticaria idiopática crónica en adultos y niños desde los 6 meses.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-27000/22

TRAMAVOLTA

TRAMADOL CLORHIDRATO + PARACETAMOL



Principio Activo	Tramadol clorhidrato - Paracetamol
Composición	37,5 mg + 325 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Tratamiento del dolor moderado a severo, tanto agudo como crónico
Presentación	30 Comprimidos Recubiertos
Registro Sanitario	F-17752/19

TRICOLON

PARGEVERINA



Principio Activo	Pargeverina clorhidrato
Composición	5 mg/mL
Forma Farmacéutica	Solución para gotas orales
Indicaciones	Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genito urinario.
Presentación	15 mL
Registro Sanitario	F-26074/21



TRONSALAN

TRAZODONA



Principio Activo	Trazodona
Composición	100 mg
Forma Farmacéutica	Cápsula
Indicaciones	Tratamiento de los episodios depresivos mayores con o sin ansiedad manifiesta.
Presentación	30 mL
Registro Sanitario	F-24690/19

TUNTÁ

PROPAFENONA



Principio Activo	Propafenona clorhidrato
Composición	300 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Indicado en la prevención y tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco: extrasístoles, taquicardias, taguiarritmias ventriculares y supraventriculares, síndrome de Wolf Parkinson-White.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-22957/21

VERALPRES

VALSARTÁN



Principio Activo	Valsartán
Composición	80 mg y 160 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-22214/20 F-22215/20

Indicaciones

Hipertensión arterial: Tratamiento de la hipertensión. Insuficiencia cardíaca: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca (clases II-IV de la NYHA) en adultos que reciben tratamientos habituales con diuréticos, digitálicos y/o bien inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o bien betabloqueantes, pero no ambos; no es obligatorio que el paciente esté recibiendo todos estos tratamientos habituales. Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Valsartán está indicado para mejorar la supervivencia después de un infarto de miocardio en adultos con un estado clínico estable pero con signos, síntomas o hallazgos radiológicos de insuficiencia ventricular izquierda o con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

VESNIDAN

DIOSMINA + HESPERIDINA



Principio Activo	Diosmina + Hesperidina
Composición	450 mg + 50 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos
Presentación	Estuche 30 y 60 comprimidos recubiertos
Registro Sanitario	F-13790/19

Indicaciones

Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, orgánica y funcional que se manifiesta por: pesadez, dolor y calambres nocturnos en las extremidades inferiores. Tratamiento de hemorroides y de los signos funcionales ligados a las crisis hemorroidales: dolor, tenesmo, prurito, edema, rubor, sangramiento; con las siguientes restricciones: indicación quirúrgica perentoria de enfermedad hemorroidal, asociación simultánea con otra patología anal, hemorroides procidentes permanentes u otra patología causal.

VITABRAL

MULTIVITAMÍNICOS



Principio Activo	Multivitamínicos
Composición	Multivitamínicos
Forma Farmacéutica	Cápsulas blandas
Presentación	30 Cápsulas blandas
Registro Sanitario	Suplemento

ZOPERIL

ZOPICLONA



Principio Activo	Zopiclona
Composición	7,5 mg
Forma Farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Indicaciones	Tratamiento a corto plazo del insomnio.
Presentación	30 Comprimidos
Registro Sanitario	F-16990/18

VADEMECUM 2023



Para mayor información, contacte a Dirección Médica
direccionmedica@eurofarma.com
Eurofarma Chile SPA
Av. Miraflores 9827 – Pudahuel – Santiago
Teléfono 56 224831600

EUROCL070623