

ISACORT® é uma solução injetável de dexametasona 2 mg/mL, de aplicação por via endovenosa, intra-articular ou intramuscular.

A dexametasona é um análogo sintético da prednisolona, porém, com atividade antiinflamatória e efeitos metabólicos e hormonais melhorados. Sua atividade antiinflamatória é mais potente que outros esteroides até aqui sintetizados, tais como: prednisona, prednisolona e hidrocortisona; assim sendo, as doses aplicadas são inferiores a destes esteroides.

FÓRMULA

Cada mL contém:

Dexametasona.....	2,0 mg
Veículo q.s.p.....	1,0 mL

INDICAÇÕES

ISACORT® solução é indicado como tratamento básico nos processos inflamatórios ou como coadjuvante (associado à terapia específica) no tratamento das infecções bacterianas.

CÃES E GATOS: Inflamações, bursites, poliartrites, miosites e luxações.

É indicado também como medicação de suporte nos acidentes cirúrgicos.

SUÍNOS: Inflamações e artrites.

BOVINOS: Inflamações, artrites, bursites, cetose, febre vitular e do transporte.

EQUINOS: Inflamações, artrites, bursites, carpites, miosites, tendinites, luxações e como medicação auxiliar na fadiga.

ISACORT® solução é indicado como coadjuvante nos processos infecciosos (pneumonias, mamites e metrites), sempre usado concomitantemente com antibióticos ou quimioterápicos específicos. Também é indicado como medicamento auxiliar nos acidentes por mordedura de cobra, picadas de insetos, alergias, intoxicações, nas doenças reumáticas e dermatológicas.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Vias endovenosa, intramuscular ou intra-articular.

Como em qualquer corticoideterapia, a terapêutica com **ISACORT® solução** deve ser estabelecida de acordo com a gravidade da afecção, duração do tratamento e tolerância do paciente.

POSOLOGIA

FELINOS	de 0,070 a 0,125 mL
CANINOS	de 0,125 a 0,50 mL
BOVINOS	de 2,50 a 5,00 mL
EQUINOS	de 1,25 a 2,50 mL
SUÍNOS	de 2,00 a 6,00 mL

- Deve-se repetir a dose quando necessário, a critério do Médico Veterinário.
- A dose de manutenção nos tratamentos prolongados, é a metade da indicada.
- O produto deve estar aproximadamente à temperatura corporal ao ser injetado.

PRECAUÇÕES

- Todas as precauções e contraindicações que existem para os corticosteroides se aplicam ao **ISACORT® solução**. Os efeitos adversos como retenção de sódio e líquidos, perda de potássio, ganho de peso, depressão da função córtex-adrenal, quando se aplicam altas doses ou por tratamento prolongado devem ser levados em consideração.

- Não se deve aplicar o produto nos últimos meses de gestação.
- Nos equinos tratados com doses acima de 5 mg pode surgir sonolência que desaparece após 24 horas.

Nos tratamentos prolongados, é recomendável não interromper bruscamente e sim usar-se de um esquema regressivo de dosagens.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO:

OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS E SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS:

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE.

BOVINOS:

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 96 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO

Frasco ampola com 10 mL.

DATA DE VENCIMENTO: 03 (três) anos após a data de fabricação.

Nº DA PARTIDA, DATA DA FABRICAÇÃO E DATA DO VENCIMENTO:

Vide cartucho.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.076/92 em 21/09/92.

Téc. Resp.: Roberta Costa e Sousa Rezende - CRF-SP 88.540

PEARSON
SAÚDE ANIMAL

Fabricante e Proprietário:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6

Itaqui / Itapevi - SP

CEP: 06696-000

CNPJ: 61.190.096/0008-69

Indústria Brasileira

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO** 
0800-709-1999